

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-585210

ND: 59026

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 01353	Société : ROYAL AIR MAROC		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : MEGHARI ABDELLAH			
Date de naissance : 16/04/1952			
Adresse : 103, RUE DU ABDELLAH ZAKH, CASA			
Tél. : 0661973492	Total des frais engagés : 125,70 Dhs		

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
cpo pr A. BENNIS PAR WH et Sapp			
Date de consultation : 09/11/2020			
Nom et prénom du malade : N= BENJELLOUN HABIBA Age : 61 ans			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : MAMMOGRAPHIE			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : DEC. 2020			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent :

45 CUEIL

Le 06/11/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/10/2011	1		150	INP 10910269111 Signature de Dr. BENTIVIVI RÉGISTRE CARDIOVASCULAIRES maladies cardiovasculaires 25.10.2011 BLANCA - MAAP
10/10/2011	1		150	
11/10/2011	1		150	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>Pharmacie DIAMANT VERT BY BOUZOUBAA (ARLI) Dr. Hassan BOUZOUBAA Rahma GH3 N° 38 - Casablanca Tél: 05 22 69 78 37</p>	<p>DIAMANT VERT ARLI A2126 37</p>	<p>125,30 DHS</p>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des SoinS	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
					
					
					
					
					

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			<input type="text"/>


O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
25533411	11433552

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Professor Ahmed BENAISS

Professor de Cardiologia

Ancien Chef de Service de Cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Actes Président de la Société Marocaine de Cardiologie

Fellow of The European Society of Cardiology

Fellows of The European Society of Cardiology
Fellows of The American College of Cardiology

Casablanca le : _____

CASA Le 09/11/2020

— 10 — *Journal of RENCI* [11]

125,30

1) VAXIGRIP Préparation Injectables Seringue 0,5 ML

Professeur Ahmed BENNIS
Spécialiste des maladies cardiovasculaires
98, Bvd SAADI 105 - 1000 ARIF
TÉL: 3337/23 36 99

98 Angle Rue Kadi Issa et Rue Abou Sait Andaloussi | Près de la commune urbaine du Maârif
Casablanca - Tél. : 0522253600 - Fax : 0522253601 - Mobile : 0661321866
Patente : 35780852 - Mail : ahmedbenni7@gmail.com



Professeur Ahmed BENNIS

Professeur de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Ancien Président de la Société Marocaine de Cardiologie

Fellow of The European Society of Cardiology

Fellow of The American College of Cardiology

Casablanca le :

CASA , Le 09/11/2020

Mme Habiba BENSLIM

1) VAXIGRIP Préparation Injectable Seringue 0,5 MI

Professeur Ahmed BENNIS
Spécialiste des maladies cardiovasculaires
98, RUE KADI LASS - MAÂRIF
CASABLANCA
Tél.: 0522 25 36 00



335, Avenue Mohammed V - Rabat
Tél : +212 537 76 11 21 - Fax : +212 537 76 84 01
<http://www.sante.gov.ma>

وزارة الصحة
+٢١٢ ٥٣٧ ٧٦ ١١ ٢١
Ministère de la Santé



المملكة المغربية
+٢١٢ ٥٣٧ ٧٦ ١١ ٢١
ROYAUME DU MAROC

Carte de Vaccination Contre la grippe saisonnière 2020 - 2021

N°carte (N°dans l'ordonnancier) :
.....



Région	
Povince / Préfecture	
Commune / Ville	

Informations sur le vacciné et la vaccinovigilance

Nom et Prénom		
Sexe	M <input checked="" type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Age		
CIN		
Adresse		
Tel		

Information sur le vaccin contre la grippe

Date dispensation	Nom de spécialité	N° lot	Date de péremption	Cachet du pharmacien d'officine
04/12/2020	Vaigrip	3206		

NB : En cas d'apparition d'effet indésirable suite à la vaccination il faut le notifier au centre Anti Poison et Pharmacovigilance du Maroc (CAMP) par téléphone : 0801000180, 24/24h et 7j/7 ou par mail: capm@capm.ma

Vaccination

Médecin prescripteur	
Lieu de vaccination	
Vaccinateur (cachet)	
Date de vaccination/...../.....

**Suspension injectable
en seringue préremplie**

Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté)

Saison 2020/2021

Veillez lire attentivement cette notice avant de vous faire vacciner, vous ou votre enfant, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
3. Comment utiliser VaxigripTetra ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VaxigripTetra ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aussi aide à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible d'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1

Ain sebâ Casablanca

VaxigripTetra 15 µg/0,6 ml

sol 1/jb1

P.F.V. : 125,30 DH



5 118001 082247

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?

Pour être certain que VaxigripTetra vous est adapté ou est adapté à votre enfant, il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si l'un des points ci-dessous vous concerne ou concerne votre enfant. Si l'y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, demandez à votre médecin ou votre pharmacien de vous l'expliquer.

N'utilisez jamais VaxigripTetra

- Si vous ou votre enfant êtes allergique :
 - aux substances actives, ou
 - à l'un des autres composants de ce vaccin (mentionnés dans la rubrique 6), ou
 - à tout constituant pouvant être présent en très petites quantités comme les œufs (ovalbumine, protéines de poulet), la néomycine, le formaldehyde ou l'octoxinol-9.
- Si vous ou votre enfant avez une maladie avec une température élevée ou modérée ou une maladie aiguë, la vaccination doit être différée après la guérison.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser VaxigripTetra.

Avant la vaccination, vous devez dire à votre médecin si vous ou votre enfant :

- souffrez d'une faible réponse immunitaire (immunodéficience ou prise de médicaments affectant le système immunitaire),
- souffrez de troubles de la coagulation ou êtes souvent sujet aux bleus.

Votre médecin décidera si vous ou votre enfant devez être vacciné.

Un événissement peut survenir (surtout chez les adolescents) après, voire avant, toute injection avec une aiguille. Aussi, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère si vous ou votre enfant vous êtes événouis lors d'une précédente injection.

Comme pour tous les vaccins, VaxigripTetra peut ne pas protéger complètement toutes les personnes vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois nés de femmes vaccinées au cours de leur grossesse peuvent ne pas être tout protégés.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ou votre enfant faites une analyse de sang dans les quelques jours qui suivent la vaccination grippale, parlez-en à votre médecin. En effet, des résultats de tests faussement positifs ont été observés chez quelques patients qui avaient été récemment vaccinés.

Enfants

L'utilisation de VaxigripTetra n'est pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 6 mois.

Autres médicaments et VaxigripTetra

Informez votre médecin ou pharmacien si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre vaccin ou tout autre médicament.

- VaxigripTetra peut être administré en même temps que d'autres vaccins, mais sur des membres différents.
- La réponse immunologique peut être diminuée en cas de traitements immunosupresseurs tels que les corticostéroïdes, les médicaments cytotoxiques ou la radiothérapie.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce vaccin. VaxigripTetra peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.

VaxigripTetra peut être utilisé pendant l'allaitement.

• médecins/pharmacien sera en mesure de décider si vous devez ou non recevoir VaxigripTetra.

Utilisation de véhicules et utilisation de machines

VaxigripTetra n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des voitures et à utiliser des machines.

VaxigripTetra contient du potassium et du sodium

• médicament contient moins de 1 mmol de potassium (39 mg) et moins de 1 mmol sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans potassium » et sans sodium ».

3. Comment utiliser VaxigripTetra ?

Posologie

Les adultes reçoivent une dose de 0,5 mL.

Utilisation chez les enfants

Les enfants âgés de 6 mois à 17 ans reçoivent une dose d'au moins de 0,5 mL. Si votre enfant a moins de 9 ans et n'a pas une seconde dose de 0,5 mL devra être administrée 4 semaines.

Si vous êtes enceinte, la dose de 0,5 mL qui grossesse peut protéger votre enfant dès sa naissance.

Demandez plus d'information à votre médecin.

Comment VaxigripTetra est administré

Votre médecin ou votre infirmier/ère administrent une injection dans le muscle ou sous la peau.

Si vous ou votre enfant avez reçu plus de VaxigripTetra

Dans certains cas, une dose plus importante peut être administrée par inadvertance. Dans ces cas, les rapports, ils correspondent à ce qui est recommandé (voir rubrique 4).

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de VaxigripTetra, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce vaccin peut ils ne surviennent pas systématiquement chez tous les patients.

Réactions allergiques

Contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien si vous ou votre enfant présentez des réactions allergiques, jusqu'à une personne sur 1000) pouvant mourir. Les symptômes peuvent inclure éruption cutanée, difficultés à respirer, essoufflement, gonflement de la langue, une peau froide et moite, ou évanouissement.

Autres effets indésirables rapportés chez l'homme

Très fréquent (pouvant affecter plus d'une personne sur 10)

• Maux de tête, douleurs musculaires (myalgies)

Fréquent (entre 1 et 10 personnes sur 100)

• Fréquent (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)

• Fièvre (2), frissons, réactions au site d'injection, durcissement (induration).

• Peu fréquent chez les personnes âgées

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

• Sensation vertigineuse (2), diarrées, nausées, ballonnements (écchymoses), démangeaisons (prurit)

• Rare chez les adultes (entre 1 et 10 personnes sur 100)

• Bouffées de chaleur : vues uniquement chez les adultes

• Gonflement des ganglions du cou, des腋窝, des seins et des genoux uniquement chez les adultes.

Rare (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)

• Anomalies de la perception du toucher (paresthésie), somnolence, augmentation de la faiblesse inhabituelles (asthénie), syndrome

• Douleurs articulaires (arthralgias), inconfort chez les adultes.