

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation | : contact@mupras.com |
| O Prise en charge | : pec@mupras.com |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº W19-594204

ND : 52189

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	1530	Société :	LAM
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensiopné(e)	<input checked="" type="checkbox"/> Autre :	MANSOUR HASSAN
Nom & Prénom :		MAHMOUD HASSAN	
Date de naissance :		15/05/1981	
Adresse :		32, Rue de Belvédère Casablanca	
Tél. :		0661464641	
Total des frais engagés : 230.62			
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : Hassan HASSAN Age:			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

MUPRAS
ACCUEIL

i DEC. 2020

Le : / /

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____

Signature de l'adhérent(e) : _____



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Cœfficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/12/2020			G	<p style="text-align: center;">INPE : 091191981</p> 

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie YACOUB EL MANSOUR Mme ZINEB BENNAJIB 65, Bd Yacoub El Mansour 2253204 - Casablanca	15/12/2020	290,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
.....
.....
.....
.....
.....

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

BELIEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000	G	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		00000000 35533411		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
		21433552 11433553		DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

Docteur Loubna KABBAJ

Médecine générale

Femmes - Hommes - Enfants

- Ancien médecin Urgentiste Polyclinique CNSS Derb Ghallef, Casablanca
- Diplôme Universitaire de Diabétologie Faculté de Médecine de MONTPELLIER
- Diplôme Inter-Universitaire Hypertension Artérielle Faculté de Médecine de STRASBOURG
- Echographie générale
- Electrocardiogramme

الدكتورة لبنى قباج

الطب العام

نساء - رجال - أطفال

- طبيبة مستعجلات بمصحة درب غلف المتعددة التخصصات للضمان الاجتماعي سابقا
- دبلوم جامعي في مرض السكري كلية الطب مونتوبولي
- دبلوم بين جامعي في مرض إرتفاع ضغط الدم كلية الطب ستراسبورغ
- الفحص بالصدى
- التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : 15/12/2020 الدار البيضاء في :

MR MANANE HASSAN



- ✓ 144,50
- Raciper 40 mg - comprimé
1 Comprimé, matin, pendant 2 mois avant petit déjeuner

✓ 66,40

 - Labixten 20 mg - comprimé
1 Comprimé, matin, pendant 7 jours

✓ 177,00

 - Nurodol 200 mg - comprimé enrobé
1 comprime matin midi et soir pendant 6 jour
 - Vitamine d3 b.o.n. 200 000 ui / ml - solution injectable im et buvable
1 ampoule/mois pendant 3 mois
- ✓ 20,90
- ✓ 23,23
- ✓ 29,63



Docteur Loubna KABBAJ

Médecine générale

Femmes - Hommes - Enfants

- Ancien médecin Urgentiste Polyclinique CNSS Derb Ghallef, Casablanca
- Diplôme Universitaire de Diabétologie Faculté de Médecine de MONTPELLIER
- Diplôme Inter-Universitaire Hypertension Artérielle Faculté de Médecine de STRASBOURG
- Echographie générale
- Electrocardiogramme

الدكتورة لبني قباج
الطب العام

نساء - رجال - أطفال

- طبيبة مستعجلات مصححة درب غلف المتعددة التخصصات للضمان الاجتماعي سابقا
- دبلوم جامعي في مرض السكري
- كلية الطب مونتوبولي
- دبلوم بين جامعي في مرض إرتفاع ضغط الدم
- كلية الطب ستراسبورغ
- الفحص بالصدى
- التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : 15/12/2020 الدار البيضاء في :

MR MANANE HASSAN

- ✓ 144,50
- Raciper 40 mg - comprimé
1 Comprimé, matin, pendant 2 mois avant petit déjeuner

✓ 66,40

 - Labixten 20 mg - comprimé
1 Comprimé, matin, pendant 7 jours

✓ 170,00

 - Nurodol 200 mg - comprimé enrobé
1 comprime matin midi et soir pendant 6 jour
 - Vitamine d3 b.o.n. 200 000 ui / ml - solution injectable im et buvable
1 ampoule/mois pendant 3 mois
- ✓ 20,90 + 3.
- ✓ 29,26

Pharmacie Yacoub El Mansour
Mme ZINEB FEDDANI
63-65 Bd Yacoub El Mansour
Tél: 022255204 - Casablanca

KABBAJ
Médecine générale
Angle Av 1 Djarra et Bd Anoual
Dr Loubna KABBAJ
Abdelmouen Al Talib Center
et Bd Talib Center
Casablanca

05 22 86 14 93

lkabbaj@hotmail.fr

Abdelmouen center, Angle bd Abdelmouen et Bd Anoual
1er étage, bureau 109 - Casablanca

05 22 86 14 93

lkabbaj@hotmail.fr

مجمع عبد المؤمن، زاوية شارع عبد المؤمن وشارع أنوار الطابق الأول
الرقم 109 الدار البيضاء

ZENITH Pharm

AMM N°171/16 DMP/2



6 118001 2722
PPV : 20,90 DH

ZENITH Pha

AMM N°171/16 D1



6 118001 2
PPV : 20,90 D

ZENITH Pharma

AMM N°171/16 DMP/21/NNPR



6 118001 272228
PPV : 20,90 DH

سبب اصفرار الجلد وتحول لون البول إلى



Fabriqué par:
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Village Gangwala, Tehsil Paonta Sahib,
Distt. Sirmour - 173 025, Himachal Pradesh, Inde
Importé par:
SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC
169, Avenue Hassan 1er, 20070, Casablanca

PPV: 14ADH50
CODE No: MP/DRUGS/MNB/95/2

تظهر لدى شخص واحد من بين 10000

شخص)
- تغير في عدد خلايا الدم بما في ذلك: أنيات (نقص في عدد الكريات البيضاء).
- حرونة.
- هلوسة صورية، أو حسية أو سمعية.
- اضطرابات كبيرة شديدة مما يؤدي إلى شلل كيدي والتهاب في الدماغ.
- ظهور مخاطن لطلع جلدي شديد، وثبور أو تغير كثيف للجلد (زود فعل على شكل فحافعات) يصاحبه حمى وألم في المفاصل (حمامي متعددة الأشكال، متازمة ستفن جونسون، انحلال البشرة الصفراء).

- ضغط العضلات.
- مشكل حادة في الكلى.
- انفاس الشئين لدى الرجال.
تأثيرات غير مرغوب فيها ذات تردد غير معروف (لا يمكن تذير التردد في ظل البيانات المتاحة).

إذا كنت تتناول راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة، لاكتermen ثلاث أشهر، يمكن أن تختفي مسوبيات المغزبزيم في الدم، يمكن أن تختفي مستويات الكربوكسونات في الدم، يمكن أن تؤدي إلى ارتعاش العضلات، ارتياخ، تشنجات، دوخة، تمازج ضربات القلب، إذا كنت تعاني من أحد هذه الاعراض، الرجاء إبلاغ طبيبك زوراً، يمكن تختفي مستويات المغزبزيم أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم، قد يزور طبيبك إجراء اختبارات الدم لتقدير ملائمة مسوبيات المغزبزيم لديك.

التهاب الأمعاء (المؤدي إلى الإسهال)
يمكن لراسبيرون® في حالات نادرة جداً أن يؤثر على خلايا الدم البيضاء مما يؤدي إلى نقص المناعة، يجب عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من هذه الاعراض مثل الحمى المصورة بالغص الشديد، أو الحمى المصورة باعراض الحمى الموضعية مثل الام في الرقبة والعنق، والفال، أو صعوبة في النوم، إذا بزرت لديك هذه الاعراض، يمكن أن توفر المعلومات حول الأدوية التي تناولتها في هذه الحالة.

لا يجب تجاهل حيل هذه الفحافع التي تضم التأثيرات الغير مرغوب فيها المختلفة لأنك قد لا تلاحظها، إنما تؤثر تأثيرات غير مرغوب فيها، المرجو إشعار طبيبك أو الصيدلي بذلك.
شدة بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها، المرجو إشعار طبيبك أو الصيدلي بذلك.

7. تحذيرات خاصة ونواهي الاستعمال

المرجو الانتهاء عند تناول راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة؛
إذا كنت تعاني من اضطرابات حالة على مستوى الكبد.

إذا كنت تعاني من اضطرابات حالة على مستوى الكبد.
آخر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة.

يمكن لراسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة، إن يخي اعراض المعدة، يجب اخبار طبيبك فوراً في حالة:

فقدان الوزن دون سبب وصعوبة في النبع،
الام في المعدة أو عسر الهضم،
تقى الطعام أو الماء،
براز أسود ملون بالدم.

عد وصف صداع "عد الطلاق" عند الطلاق حسب احتجاجاته، يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا استمرت أو تغيرت الاعراض.

إن تناول مفرط محتوى البروتون مثل راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة، خاصة خلال مدة فوق السنة، من شأنه زيادة طفيفة من حطر كمور الورك والرamus او العمود الفقري، اخبار طبيبك إذا كنت تعاني من هشاشة العظام او تناول السترونيدات (التي يمكن أن تزيد من خطير ترقق العظام).

سوانغ ذو تأثير معروف : السكاروز، سبب احتجاجاته على السكاروز، لا ينصح استخدام هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من حساسية للفركوز، سوء امتصاص الجلوكوز والجالاكتوز أو نقص المكرازان /إيزوماتاز (مرض وراتي نادر).

8. التفاعلات

استعمال الوية أخرى:
إذا كنت تناول او قد تناولت مؤخراً دواء آخر بما في ذلك دواء ممتنع بدون وصفة طبية،
آخر طبيبك أو الصيدلي، يمكن راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة، إن تفاعل مع وظائف اوية أخرى والمعنى.

يمنع تناول راسبيرون® في حال كنت تتناول الوية التالية:
البنفيتير (الذي يستعمل في علاج فقرات المناعة البشرية)،
يجب إخبار طبيبك أو الصيدلي في حال كنت تتناول الوية التالية:

الأيتارافيتار (الذي يستعمل في علاج فقرات المناعة البشرية)،
الكتوكوتازول، الأيتاراكوتازول أو الفوريكتونازول (الذي يستعمل في علاج السرطان)،
الأنثين (الذي يستعمل في علاج السرطان).

المرجو قراءة كامل هذه النشرة بتمعن قبل تناول هذا الدواء.
حافظ على هذه النشرة قد تحتاج لقراءتها من جديد في وقت لاحق.
إن كان لديك أي استفسار أو تشكيل أي شك، المرجو استشارة الطبيب أو الصيدلي قصد الحصول على المزيد من المعلومات.
تم تصميم هذا الدواء لك شخصياً لذا لا تعطيه لأي شخص آخر حتى في حال تلقي الأعراض لأنه قد يضر به.
في حال اردت شدة التأثيرات غير المرغوب فيها أو لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيه
ذكر في هذه النشرة، الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

1. تركيبة الدواء

يحتوي كل قرص مقاوم لحموضة المعدة على 20 ملغ أو 40 ملغ من المادة الفعالة: ازومبرازول (على شكل أميد الأوزول المغزبزيم).
المكونات الأخرى : الكرات السكرية، هيدروكسى بروبيل، السليلوز (L-HPC)،
هروسوبيوفن (PPXL-30)، ماكروكول 400، تالك مونتي،
هيدروموليور فلات (HP-555)، هيدروموليور الميكروكستالين، PH112، الكروسوبيوفن (PPXL)،
ماكروكول 6000، سيلولوز الصوديوم، أودادي بي 03B86651، ماكروكول 4000، كحول
إيزوبروريليك، سيلولوز الميثيلين، الماء المنقى.
قائمة المساعدات ذات تأثير معروفة : السكاروز (الكرات السكرية)

2. الفئة الصيدلانية العلاجية

يحتوي راسبيرون® على مادة فعالة تسمى ازومبرازول، ينتمي هذا الدواء إلى فئة مثبتات مضخة البروتون، فهو يقلل من إفراز الحمض في المعدة.

3. الإرشادات العلاجية

يستخدم راسبيرون® 20 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة لعلاج الأمراض التالية:
البالغين والأطفال بعد سنة فأكثر
الارتفاع العديدي العربي عند صعود حمض المعدة إلى المرئي وتسبيبه في الام والالتهاب والقرحة.
فرحة المعدة أو الاتي عشر في حال الإصابة بجرح ثومية تدعى هيليكوباكتر بيلوري، إذا انتفخت عليه هذه الحال، قد يصف لك الطبيب أيضاً بعض المضادات الحيوية لعلاج هذا المرض والتالي من القرحة.

البالغين

العلاج والوقاية من القرحة المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب الامستيروديما.
أفراز مفرط لحمض المعدة بسبب متازنة زولينجير إليسون.
يستخدم راسبيرون® 40 ملغ، أعراض مقاومة لحموضة المعدة لعلاج الآثار التالية:
علاج التهاب المريء التآكلية بالإرتجاع عند صعود حمض المعدة إلى المرئي وتسبيبه في الام والالتهاب والقرحة.
أفراز مفرط لحمض المعدة بسبب متازنة زولينجير إليسون.
استمرار العلاج بعد الوقاية بتناول ازومبرازول غير الوريد لدى عودة التزيف الناتج عن القرحة الهمضية.

4. الجرعة، طريقة و/أو موضع تناول الدواء، عدد مرات تناول الدواء و مدة العلاج

تعليمات من أجل الاستعمال الجيد
تناول داناما راسبيرون® كما وصفه لك طبيبك تماماً، استمر طبيبك ماماً، لا ينصح بتناول راسبيرون® 20 ملغ و 40 ملغ مقاوم لحموضة المعدة من قبل الأطفال أقل من 12 سنة.
إذا كنت تتناول هذا الدواء لفترة طويلة (وخاصة من سن واحدة) يجب على الطبيب وضع تحذير طارقية.
إذا أمر طبيبك بتناول هذا الدواء "عند الطلاق" حسب الحاجة، يجب إبلاغه بأي تغيرات بالآعراض.

طريقة تناول الدواء

يمكنك أن تتناول الأدوية في أي وقت من اليوم.
يمكن تناول الأدوية خلال أو بين الوجبات.

يلعب الفرس توكب ماء، يمنع مضغ أو سحق الأدوية، يمكن الفرس من حببات تغليف حماية الدواء من حموضة المعدة والتي لا يجب أن يلعقها أي ضرر قبل المرور في المعدة.
ما توجب تغيير المقادير به في حال ارتفاع مصادر معلومات في بلغ الأدوية

في حالة سوربات في كوب ماء (غير غاري)، يمنع استعمال أي سائل آخر.

قم بتقطيع الخليط إلى أن يذوب الفرس (لا يجب أن يكون الخليط واحداً).
بعد ذلك، اشرب الخليط الذي يحتوي على الحبيبات الصغيرة بشارة أو خلال 30 دقيقة. قم دائم بتقطيع الخليط قبل شربه.
من أجل تناول الجرعة بأكملها، اغسل الكأس بإضافة نصف كوب ماء ثم اشربه. يجب بلع جميع الحبيبات دون مضاعف أو سحقها.
بالنسبة للمرضى الذين لا يستطيعون البلع، يمكن تزويب الفرس في الماء وتناوله بواسطة

NURODOL® 200 mg, comprimé enrobé, boîte de 20

Ibuprofène

Pour les médicaments non soumis à prescription médicale :

<Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, envoi à Zentheren en suivi si nécessaire, ou à votre pharmacien ou à votre pharmacien ou si vous sentez moins bien après (nombre de jours).

Quel contenu cette notice :

- Qu'est-ce que NURODOL 200 mg, comprimé enrobé et dans quelles cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NURODOL 200 mg, comprimé enrobé?
- Comment prendre NURODOL 200 mg, comprimé enrobé?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver NURODOL 200 mg, comprimé enrobé?
- Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE NURODOL 200 MG. COMPRIME ENROBE ET DANS QUELLES CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité : Ce médicament appartient à la classe des Anti-inflammatoires, Antirhumatiques, non stéroïdiens.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène. Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (environ 6 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE NURODOL 200 MG. COMPRIME ENROBE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indication :

Ne prenez jamais NURODOL 200 mg, comprimé enrobé dans les cas suivants :

- A partir du 6e mois de grossesse,
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proches telles qu'autres AINS, aspirine,
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du comprimé,
- Ulcère gastro-duodenal en évolution,
- Insuffisance hépatocellulaire sévère,
- Insuffisance rénale sévère,
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée,
- Lupus érythémateux disséminé. La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 6 ans car elle peut entraîner une fausse route. **EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec NURODOL 200 mg, comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales :

A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des inconvenients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Précautions particulières d'emploi :

Avant d'utiliser ce médicament, prévenez votre médecin en cas :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez, L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS (cf Contre-indications).
- de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves,
- d'antécédents digestifs (hémie hystiale, hémorragies digestives, ulcères de l'estomac ou du duodénum anciens),
- de maladie du cœur, du foie ou du rein.

A cours du traitement, en cas :

- de troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MEDECIN,
- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet du sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir)

ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

- de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou.

- Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
- Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine. Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Enfants et adolescents

Sans objet.

Interactions avec d'autre médicament :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment les anticoagulants oraux et les antiagrégants plaquettaires, les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, (y compris l'aspirine et ses dérivés à fortes doses), le lithium, le méthotrexate, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. Informez, par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien en cas de traitement par un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un inhibiteur de l'angiotensine II, un bêtabloquant ou un médicament contenant de la ciclosporine.

Interaction avec les aliments et les boissons :

Sans objet

Interaction avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse :

Au cours des 5 premiers mois de votre grossesse, votre médecin peut être amené, si nécessaire à vous prescrire ce médicament. A partir du 6ème mois de grossesse, vous ne devez en aucun cas prendre de ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise. Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce cas,

respectez strictement l'ordonnance.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait pendant l'allaitement, DE LA GROSSESSE OU DE VOTRE MEDECIN OU MEDICAMENT.

Sportif :

Sans objet

Effet sur l'aptitude à conduire

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de vue.

Exipient à effet notoire : Saccharose

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE NURODOL 200 MG. COMPRIME ENROBE ?

Instruction pour un bon usage.

Posologie et mode d'administration :

ADAPTE À L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 20 kg (environ 6 ans).

Affections douloureuses et/ou fièvres

Chez l'enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 11 ans) : 1 comprimé (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 3 comprimés par jour (600 mg).

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans) : 1 à 2 comprimés (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 6 comprimés par jour (1200mg).Le sujet agé présentant un risque accru d'effets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).La posologie maximale est de 6 comprimés par jour (1200 mg).

Mode d'administration

Vole orale. Avaler le comprimé, sans le croquer, avec un grand verre d'eau. Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement

Chez l'enfant et l'adolescent, si ce médicament est nécessaire plus de 3 jours, ou si les symptômes s'aggravent, il est conseillé de consulter votre médecin.

Chez l'adulte si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin.Si vous avez l'impression que l'effet de NURODOL 200 mg, comprimé enrobé, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

En cas de surdosage accidentel ou d'intoxication. ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre NURODOL 200 mg, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NURODOL 200 mg, comprimé enrobé peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets gastro-intestinaux :

- Nausées ;

- Vomissements ;

- Gastralgies ;

- Dyspepsies ;

- Troubles du transit ;

- hémorragies oculaires ou non.

Réactions d'hypersensibilité :

- Dermatologiques : éruptions, rash, prurit, œdème, aggravation d'urticaire chronique.

- Respiratoires : la survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (cf Contre-indications).

- Générales : œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou).Effets sur le système nerveux central :

- l'ibuprofène peut exceptionnellement être responsable de vertiges et de céphalées.

Autres :

- quelques rares cas de troubles de la vue ont été rapportés.

- Oliguria, insuffisance rénale.

- La découverte d'une ménigrité aseptique sous ibuprofène doit faire rechercher un lupus érythémateux disséminé ou une connectivite.

- quelques modifications biologiques ont pu être observées :

- Hépatiques : augmentation transitoire des transaminases.

- Hématologiques : agranulocytose, anémie hémolytique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NURODOL 200 MG. COMPRIME ENROBE ?

• Tenir ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

• Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte (La date de péremption fait référence au dernier jour du mois mentionné).

Conditions de conservation :

Pas de précaution particulière de conservation.

« Ne jetez aucun médicament au tout-t-l'égoût ni avec les ordures ménagères ». Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Quel contenu NURODOL 200 MG. COMPRIME ENROBE ?

Composition qualitative et quantitative en substance active par comprimé :

Ibuprofène 200 mg

Composition qualitative en excipient : Noyau : Amidon de maïs, Amidon prégalatinisé, Silice collodiale Anhydre, Acide stéarique.

Enrobage : Saccharose, dioxyde de titane (E171), Macrogol 6000, Perfectamyl gel 45, Povidone K30, Polysorbate 80, Talc, Carbonate de calcium, Oxide de fer rouge (E172), Cire de carnauba, Eau purifiée.

Nom et adresse de l'EPF titulaire de l'AMM au Maroc

Laboratoires SYNTHMEDIC

20-22, Rue Zoubier brou Al Aouam

Roches Noires 20300 Casablanca Maroc

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 04/18

Conditions de prescription et de livraison

Médicamenteux non soumis à prescription médicale.

PPV : 17/08

LOT :

PER :