

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Retraité RAM

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

732

Matricule : Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *ZOUHAIR MOHAMED*

Date de naissance :

1934

Adresse :

HAY YASSIMA 3 RUE SS N° 74 CASA

Tél. : *0660 50 9586* Total des frais engagés : *1511,410 DH* Dhs

Cadre réservé au Médecin

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :



Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : Lui-même

Comptoir *ACCUEIL* Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient
DROITE 12 11 21 22 GAUCHE 13 14 23 24 HAUT 15 16 25 26 17 18 27 28 19 20 29 30 BAS 21 22 31 32 33 34 43 44 35 36 45 46 37 38 47 48				

O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire
		H
D	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession		

Visu et cachet du praticien	Visu et cachet du praticien
abordant le devis	abordant l'exécution

VOLET ADHERENT	NOM : ZOUHAIR MED	Mle 732
DECLARATION N°	W18-346487	
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes
17.12.20	1511,40 DH	15 PCS
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois		
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle		



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

W18-346487

DATE DE DEPOT

201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT Mle 732

Nom & Prénom : ZOUHAIR Mohammed

Fonction : Retraité Phones : 0660309526

Mail : omzouhair25@gmail.com

MEDECIN Prénom du patient

Adhérent Conjoint Enfant Age : Date : 14/12/2020

Nature de la maladie : diabète dyslipidémie Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes : Cr Montant détaillé des honoraires : 300 DH
Date du devis : 14/12/2020
Montant de la facture : 18/11/2020

PHARMACIE Date : 14/12/2020 PHARMACIE KHOULOUD
Montant de la facture : 18/11/2020
ATTIOUI Mina Hay Yasmine 4 Rue 68 N° 2
Angle Rue 48 N° 21
Ain Chock - Casablanca
Tél : 05 22 50 22 06
Fax : 05 22 50 22 06

ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date :
Désignation des Coefficients Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX Date :
Nombre Montant détaillé des Honoraires
AM PC IM IV

CACHET

CACHET

Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition

إختصاصية في أمراض الغدد
والسكري والتغذية

Sur Rendez-Vous

Casablanca, le 14/12/2020 الدار البيضاء في

Mr ZOUHAIR MOHAMMED

REGIME SANS SUCRE ET SANS GRAS

HUMALOG MIX 25 kwik pen
12 Unités le matin

12 Unité le soir
REPAS FRACTIONNES +++

TORVA 10
1 comprimé

TECPRIIL 2.5
x3 1 comprimé

BANDELETTES A GLYCEMIE



PHARMACIE KHOULOUD
ATTIOUI Mina
Hay Yasmina 4 Rue 68 N° 21
Angle Rue 48 N° 21
Aïn Chock - Casablanca
Tél : 05 22 50 22 06
fax : 05 22 50 22 06

TRAITEMENT DE 3 MOIS

Docteur BENLALLA ELGHORFI Fatima
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Qods, Rés les Rosiers, Appt 121
Aïn Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890

PHARMACIE KHOULOUD
ATTIOUI Mina
Hay Yasmina 4 Rue 68 N° 21
Angle Rue 48 N° 21
Aïn Chock - Casablanca
Tél : 05 22 50 22 06
fax : 05 22 50 22 06

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire correspondre les signes de leur maladie avec ceux de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pour vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre trop de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale peuvent avoir des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) malade ?
- Avez-vous des problèmes récents ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourront être différents.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il pourra vous contraindre à prendre des repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine de poitrine étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'essoufflement inhabituel ou de douleur au cœur ou de poids ou un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être différents si vous prenez :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormones,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acétalsalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. ritodrine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - le danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
 - les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les médicaments peuvent diminuer généralement la production de lait maternel et augmenter au cours de la grossesse. L'administration de votre médicament peut également affecter votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction peuvent être diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire correspondre les signes de leur maladie avec ceux de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pendant vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez diminuer la quantité de sucre dans votre sang grâce à l'insuline.

- Quelques patients ayant présenté une hypoglycémie ont pu faire un passage d'une insuline animale à une autre insuline. Les symptômes annonciateurs peuvent être différents ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) malade ?
- Avez-vous des problèmes récents ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourraient être différents de ceux d'un alcool.

- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou préparateur pharmaceutique, ce horaire pourrait vous contraindre à prendre un repas par rapport à vos habitudes.

- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone. Ces patients peuvent développer une insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, tels qu'un essoufflement inhabituel, un gain de poids ou un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être différents de ceux d'un autre médicament. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions").
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormones,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acétalsalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - le danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
 - les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions").

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut être modifiée. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction sont diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire une comparaison entre les signes de leur maladie et les vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pendant vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale ont pu faire apparaître des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) malade ?
- Avez-vous des problèmes récents ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourraient être différents en raison de l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il pourrait vous contraindre à faire des pauses ou des repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine peuvent être traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'essoufflement inhabituel ou de douleur au cœur ou de poids ou d'enflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être différents en fonction de l'utilisation de certains médicaments. Les médicaments suivants peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormones,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acétalsalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - le danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
 - les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? L'utilisation d'insuline diminue généralement les risques de grossesse et augmentent au contraire les risques d'allaitement. L'administration de votre insuline peut également affecter votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction peuvent être diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) ou avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire une comparaison entre les signes de leur maladie et les vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pendant vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale ont pu faire apparaître des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) malade ?
- Avez-vous des problèmes récents ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourraient être différents en raison de l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il pourrait vous contraindre à faire des pauses ou des repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine peuvent être traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'essoufflement inhabituel ou de douleur au cœur ou de poids ou d'enflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être différents en fonction de l'utilisation de certains médicaments. Les médicaments suivants peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormones,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acétalsalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - le danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
 - les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? L'utilisation d'insuline diminue généralement les risques de grossesse et augmentent au contraire les risques d'allaitement. L'administration de votre insuline peut également affecter votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction peuvent être diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) ou avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire correspondre les signes de leur maladie avec ceux de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pour vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre trop de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale peuvent avoir des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) dans l'hypoglycémie ?
- Avez-vous des problèmes récurrents d'hypoglycémie ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourront varier avec l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il est possible que le horaire pourraient vous contraindre à prendre vos repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine de poitrine étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'angine de poitrine ou d'un essoufflement inhabituel ou d'un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par horaire,
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acétalsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- le danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
- les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut être modifiée. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction sont diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire une comparaison entre les signes de leur maladie et les signes de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pour vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre trop de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale peuvent avoir des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) dans l'hypoglycémie ?
- Avez-vous des problèmes récurrents d'hypoglycémie ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourront varier avec l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il est possible que le horaire pourraient vous contraindre à prendre vos repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine de poitrine étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'angine de poitrine ou d'un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par hormones,
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acétalsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- le danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
- les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut être modifiée. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction sont diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire une comparaison entre les signes de leur maladie et les signes de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pour vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez éviter de prendre trop de sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale peuvent avoir des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) dans l'hypoglycémie ?
- Avez-vous des problèmes récurrents d'hypoglycémie ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourront varier avec l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou à l'hôpital, il est possible que le horaire pourraient vous contraindre à prendre vos repas par rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine de poitrine étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'angine de poitrine ou d'un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par hormones,
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acétalsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- le danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
- les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut être modifiée. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction sont diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Humalog Mix25 100 UI/ml KwikPen, suspension injectable insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un autre professionnel de la santé ou par d'autres personnes. Il pourrait être nécessaire de faire une comparaison entre les signes de leur maladie et les signes de votre maladie. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen ?
2. Quelles sont les informations sur l'emballage ?
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quel cas est-il utilisé ?

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen ?

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (abaissement du sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

- Si votre glycémie est bien contrôlée par votre insuline actuelle, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont énumérés ultérieurement.

dans cette notice. Réfléchissez à ce que vous prenez avec vous pour vos repas, à la fréquence des exercices physiques. Vous devez prendre de la sucre dans votre sang grâce à la glycémie.

- Quelques patients ayant présenté un passage d'une insuline animale peuvent avoir des symptômes annonciateurs prononcés ou différents de ceux d'une insuline animale. En cas d'hypoglycémie, il est difficile à les reconnaître, parlez-en à votre pharmacien.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivante, informez-en votre médecin infirmier.

- Etes-vous récemment tombé(e) dans l'hypoglycémie ?
- Avez-vous des problèmes récurrents d'hypoglycémie ?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques ?

- Vos besoins en insuline pourront être différents en raison de l'alcool.

- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou pour une consultation, le horaire pourrait vous contraindre à prendre un repas par rapport à vos habitudes.

- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'angine de poitrine étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'angine de poitrine ou d'un gonflement localisé.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être différents en fonction des médicaments que vous prenez. Les médicaments suivants peuvent modifier la quantité d'insuline nécessaire :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormones,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acétalsalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-₂ stimulants» (ex. ritodrine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - le danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme enalapril) et
 - les antagonistes des récepteurs.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien. (voir rubrique "Avertissements et précautions")

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les médicaments peuvent diminuer généralement le niveau de glucose dans le sang pendant la grossesse et augmenter au cours de l'allaitement. L'administration de votre médicament à votre enfant peut également entraîner des effets indésirables. Demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et de réaction peuvent être diminuées en cas d'hypoglycémie. Les situations où vous pourriez être seul(e) ou avec d'autres personnes, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine à coudre, doivent être évitées. Vous devez interroger votre médecin ou votre pharmacien pour savoir si vous pouvez conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie absents.

3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen

Vérifiez toujours la désignation de l'emballage, le conditionnement et sur l'étiquette de l'emballage par votre pharmacien. Assurez-vous que l'emballage n'a pas été endommagé.

TORVA®

Atorvastatine

FORMES ET PRÉSENTATION :

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.

TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION :

- TORVA 10

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

- TORVA 20

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG Co-A réductase (C10AA05 : système

INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit dans certaines formes d'hypercholestérolémies lorsque les activités physiques, la le taux de cholestérol dans le sang.

Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales

L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.

- Maladies du foie,

- Femme enceinte ou qui allaita (cf.Grossesse/Allaitement).

- En cas d'association avec, Itraconazole, Kétoconazole, Antiprotéases (cf.Interactions).

- Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf.Interactions).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin.

Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool.

Antécédents hépatiques.

Désir de grossesse ou d'allaitement.

En cas de réaction allergique au médicament.

LOT : 1091 10 mg.
PER : 09/22 1 cp.
PPV : 57,80 DH 20 mg. 1 cp.

TORVA® 10 mg
30 Comprimés Enrobés



6 118000 140702

as permis d'abaisser
avéré insuffisant.

TORVA®

Atorvastatine

FORMES ET PRÉSENTATION :

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.

TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION :

- TORVA 10

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

- TORVA 20

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG Co-A réductase (C10AA05 : système

INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit dans certaines formes d'hypercholestérolémies lorsque les activités physiques, la le taux de cholestérol dans le sang.

Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales

L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.

- Maladies du foie,

- Femme enceinte ou qui allaita (cf.Grossesse/Allaitement).

- En cas d'association avec, Itraconazole, Kétoconazole, Antiprotéases (cf.Interactions).

- Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf.Interactions).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin.

Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool.

Antécédents hépatiques.

Désir de grossesse ou d'allaitement.

En cas de réaction allergique au médicament.

LOT : 1091 10 mg.
PER : 09/22 1 cp.
PPV : 57,80 DH 20 mg. 1 cp.

TORVA® 10 mg
30 Comprimés Enrobés



6 118000 140702

as permis d'abaisser
avéré insuffisant.

TORVA®

Atorvastatine

FORMES ET PRÉSENTATION :

TORVA 10, comprimés enrobés dosés à 10 mg, boîtes de 15 et de 30.

TORVA 20, comprimés enrobés dosés à 20 mg, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION :

- TORVA 10

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

- TORVA 20

Atorvastatine (sous forme calcique trihydratée)

Excipients q.s.p.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG Co-A réductase (C10AA05 : système

INDICATIONS :

Ce médicament est prescrit dans certaines formes d'hypercholestérolémies lorsque les activités physiques, la le taux de cholestérol dans le sang.

Il est préconisé également dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales

L'utilisation de ce médicament doit être accompagnée avec un régime alimentaire assidu.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants.

- Maladies du foie,

- Femme enceinte ou qui allaita (cf.Grossesse/Allaitement).

- En cas d'association avec, Itraconazole, Kétoconazole, Antiprotéases (cf.Interactions).

- Sauf avis contraire de votre médecin : en cas d'association avec les fibrates (cf.Interactions).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

Dans le traitement des hypercholestérolémies, respecter scrupuleusement le régime prescrit par votre médecin.

Un bilan hépatique doit être effectué avant et pendant le traitement.

En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :

Prévenez votre médecin en cas de :

Consommation d'alcool.

Antécédents hépatiques.

Désir de grossesse ou d'allaitement.

En cas de réaction allergique au médicament.

LOT : 1091 10 mg.
PER : 09/22 1 cp.
PPV : 57,80 DH 20 mg. 1 cp.

TORVA® 10 mg
30 Comprimés Enrobés



6 118000 140702

as permis d'abaisser
avéré insuffisant.

TECPRI[®]L

COMPOSE

- Ramipril (I)
- Excipients

Tecpril 2,5 mg
30 gélules



6 118000 071471

E

- C
- C
- C
- C

I

Te
- H

50,00

- Post-infarctus du myocarde compliqué d'insuffisance cardiaque persistante. Le traitement au long cours par ramipril améliore le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque sévère.

Tecpril® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg :

- Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients à risque vasculaire (notamment les coronariens et les diabétiques), ayant une maladie artérielle ischémique confirmée. Dans cette population, un traitement au long cours a significativement amélioré la survie selon l'étude

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

TECPRI[®]L faible 1,25 mg, TECPRIL 2,5 mg, 5 mg, 10 mg :

Hypertension artérielle :

- En l'absence de déplétion hydrosodée préalable ou d'insuffisance rénale (sauf en pratique courante) : la posologie initiale est de 2,5 mg par prise, pendant ou après le petit déjeuner, la biodisponibilité n'est pas altérée par la prise d'aliments. En fonction de la réponse au traitement, la posologie peut être adaptée, en respectant des paliers de 3 à 4 semaines, jusqu'à un maximum de 10 mg par jour en une seule prise. Un diurétique non hyperkaliémiant peut être associé à 5 mg de ramipril pour une baisse supplémentaire de la pression artérielle.

- Dans l'hypertension artérielle préalablement traitée par diurétiques, il faut arrêter le diurétique 3 jours avant d'administrer le ramipril, pour le faire éliminer. Si nécessaire, soit administrer la dose initiale de 1,25 mg, soit l'ajuster en fonction de la réponse tensionnelle obtenue et de la tolérance. Il est recommandé de doser la créatinine plasmatique et de revoir le traitement et dans les 15 jours qui suivent sa mise en roule.

TECPRI[®]L

COMPOSE

- Ramipril (I)
- Excipients

Tecpril 2,5 mg
30 gélules



6 118000 071471

E

- C
- C
- C
- C

I

Te
- H

50,00

- Post-infarctus du myocarde compliqué d'insuffisance cardiaque persistante. Le traitement au long cours par ramipril améliore le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque sévère.

Tecpril® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg :

- Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients à risque vasculaire (notamment les coronariens et les diabétiques), ayant une maladie artérielle ischémique confirmée. Dans cette population, un traitement au long cours a significativement amélioré la survie selon l'étude

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

TECPRI[®]L faible 1,25 mg, TECPRIL 2,5 mg, 5 mg, 10 mg :

Hypertension artérielle :

- En l'absence de déplétion hydrosodée préalable ou d'insuffisance rénale (sauf en pratique courante) : la posologie initiale est de 2,5 mg par prise, pendant ou après le petit déjeuner, la biodisponibilité n'est pas altérée par la prise d'aliments. En fonction de la réponse au traitement, la posologie peut être adaptée, en respectant des paliers de 3 à 4 semaines, jusqu'à un maximum de 10 mg par jour en une seule prise. Un diurétique non hyperkaliémiant peut être associé à 5 mg de ramipril pour une baisse supplémentaire de la pression artérielle.

- Dans l'hypertension artérielle préalablement traitée par diurétiques, il faut arrêter le diurétique 3 jours avant d'administrer le ramipril, pour le faire éliminer. Si nécessaire, soit administrer la dose initiale de 1,25 mg, soit l'ajuster en fonction de la réponse tensionnelle obtenue et de la tolérance. Il est recommandé de doser la créatinine plasmatique et de revoir le traitement et dans les 15 jours qui suivent sa mise en roule.

TECPRI[®]L

COMPOSE

- Ramipril (I)
- Excipients

Tecpril 2,5 mg
30 gélules



6 118000 071471

E

- C
- C
- C
- C

I

Te
- H

50,00

- Post-infarctus du myocarde compliqué d'insuffisance cardiaque persistante. Le traitement au long cours par ramipril améliore le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque sévère.
- Tecpril® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ;
- Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients à risque vasculaire (notamment les coronariens et les diabétiques), ayant une maladie artérielle ischémique confirmée. Dans cette population, un traitement au long cours a significativement amélioré la survie selon l'étude

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

TECPRI[®]L faible 1,25 mg, TECPRIL 2,5 mg, 5 mg, 10 mg :

Hypertension artérielle :

- En l'absence de déplétion hydrosodée préalable ou d'insuffisance rénale (sauf en pratique courante) : la posologie initiale est de 2,5 mg par prise, pendant ou après le petit déjeuner, la biodisponibilité n'est pas altérée par la prise d'aliments. En fonction de la réponse au traitement, la posologie peut être adaptée, en respectant des paliers de 3 à 4 semaines, jusqu'à un maximum de 10 mg par jour en une seule prise. Un diurétique non hyperkaliémiant peut être associé à 5 mg de ramipril pour une baisse supplémentaire de la pression artérielle.
- Dans l'hypertension artérielle préalablement traitée par diurétiques, il faut arrêter le diurétique 3 jours avant d'administrer le ramipril, pour le faire éliminer. Si nécessaire, soit administrer la dose initiale de 1,25 mg, soit l'ajuster en fonction de la réponse tensionnelle obtenue et de la tolérance. Il est recommandé de doser la créatinine plasmatique et de revoir le traitement et dans les 15 jours qui suivent sa mise en roule.