

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Declaration de Maladie

N° W19-508445

SL479

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent (e)		
Matricule : 00372	Société : RAM	A
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	Autre :
Nom & Prénom : Boussetta Halima		
Date de naissance : 01/01/1946		
Adresse : Assif C NE 319 Marrakech		
Tél. : 0661208926 Total des frais engagés : 2348,70		
Cadre réservé au Médecin Cachet du Médecin : MUPRAS 2 DEC 2020 Docteur Horia O. Jawahari Spécialiste Diabétologue - Endocrinologue - Nutrition 213, Avenue Mohamed V, Apt. 11, 2ème Etage Guéliz, Marrakech Tél. : 05 24 43 36 62		
Date de consultation : 2 DEC 2020 Nom et prénom du malade : Boussetta Halima Age : Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant Nature de la maladie : DWID + Dyslipidémie En cas d'accident préciser les causes et circonstances : <small>Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'adhérent et au médecin conseil de la Mutuelle.</small>		

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration de maladie et que j'ai pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : Marrakech
Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT	
Déclaration de maladie	N° W19-508445
Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.	
Matricule : 00372 Nom de l'adhérent(e) : Boussetta Total des frais engagés : 2348,70	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/11/2020	C 2	2	280,00	INP : 07117063 Docteur Houria O. Jawahar Spécialiste Biologie - Endocrinologie Nutrition 3, Av. Mohamed V, Appart. 11, 2ème Etage Guéliz - Marrakech (Maroc) Royal Air Maroc Tél : 05 24 43 36 62

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE KAMILIA Tél : 05 24 44 63 22	17/11/2020	712118,40
072035983		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
B. Prince My Abdellah, Imm. Beldi, Bouskoura 40000 Bld A. Abdellah 14 (1er étage) Marrakech Tél : 05 24 44 63 63 / 08 08 47 32 63 E-mail : laboratoire.essaadi@gmail.com	17/11/2020	B 230	250,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES*


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION


D.O.F
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
G		
B		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Docteur Houria O. Jawhari

Spécialiste

Diabétologie - Glandes endocrines

Cholestérol - Obésité - Goitre

Impuissances sexuelles - Maladies du sein

Retards de croissance

Nutrition

(الدكتورة حورية أ. جوهري)

اختصاصية

أمراض السكري - أمراض الغدد الهرمونية

لسمنة - الكوليستروول - الضعف الجنسي

أمراض الثدي - نقصان النمو

التغذية

Marrakech, le : 17/11/2020

Mme Boussetta Halima

Amane 2

S. V.

6010
x3

1 sp/j

.. v.

T.S.V.

Trajeants 5

374,00
x4

1 p/j

3 mois

- Nohip 20

S. V.

87,80

1 p/j

- Demofix 1ml/j

S. V.

Docteur Houria O. Jawhari
Specialiste Diabetologie - Cholesterolemie - Nutrition
Guéliz - Marrakech - Appt 11, 2ème Etage
Tél. : 05 24 43 36 62

TSVP

Pharmacie KAMILIA
Dr. Rouchra BAGHDAD
NS-7D, Lq. Bouanane - Assilah
Marrakech - Assilah
Tél : 05 24 30 63 22

213، شارع محمد الخامس رقم 11، الطابق الثاني - جلizi - مراكش (عمارة الخطوط الملكية الجوية المغربية) - الهاتف : 06 62

213, Avenue Mohamed V, Appt 11, 2ème Etage Guéliz - Marrakech (Imm. Royal Air Maroc) - Tél C. : 05 24 43 36 62 / 08 08 39 09 65

IF : 68905120 - ICE : 001629132000026 - INP : 071117063

84.20

Dermof -> Boudra v.

1848,70

1 gr (j)

Pharmacie KAMILIA
Dr. Bouchra BAGHDAD
75-79, Lot Bouanania - Assilah
Tel: 05 24 30 53 22

Docteur Houria O. Jawahari
Spécialiste
Diabetologie - Endocrinologie - Nutrition
213 Av. Mohamed V. Appr. 11, 2ème Etage
Guéliz - Marrakech - Maroc - Tel: 05 24 43 36 82

Docteur Houria O. Jawhari
Spécialiste
Diabétologie - Glandes endocrines
Cholestérol - Obésité - Goitre
Impuissances sexuelles - Maladies du sein
Retards de croissance
Nutrition

(الدكتورة حرية جوهري)
اختصاصية
أمراض السكري - أمراض الغدد الهرمونية
لسمنة - الكوستروول - الضعف الجنسي
أمراض الثدي - نقصان النمو
التغذية

Marrakech, le : 17/11/2020.

Mme Boussekts Hélène

H.S.A.C.

nickie

Trans

Docteur Houria O. Jawhari
Spécialiste
Diabétologie - Endocrinologie - Nutrition
Bld Prince My Abdellah Imm. Bab Doukkala
213, Av. Mohamed V, 11^e Etage
Guéliz - Marrakech - Maroc
Tél : 05 24 44 63 63 / 08 08 47 32 63
IF : 68905120 - ICE : 001629132000026 - INP : 071117063

213، شارع محمد الخامس رقم 11، الطابق الثاني - جلز - مراكش (شارع الخطورة الملكية الجوية المغربية) - الهاتف : 08 08 39 09 65 / 05 24 43 36 62
213, Avenue Mohamed V, Appt 11, 2^{ème} Etage Guéliz - Marrakech (Imm. Royal Air Maroc) - Tél C. : 05 24 43 36 62 / 08 08 39 09 65
IF : 68905120 - ICE : 001629132000026 - INP : 071117063

E-mail : laboratoire.essaadi@gmail.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BAB DOUKKALA

Bd.Prince My Abdellah, Résidence Bab Doukkala, Bloc A, Appt n°4-6 (1er étage) BP:40090 - Marrakech - Maroc

Dr ESSAADI Moulay Ahmed - Pharmacien Biogiste

Diplômé des Universités de Monastir et de Montpellier

Patente:45193008 - IF: 14417934 - I.N.P.E: 073060980 - C.N.S.S: 9180944 - I.C.E: 001702418000007

FACTURE: 80606/2020

Marrakech, le
Nom et prénom
Référence
Médecin prescripteur

17/11/2020
MME BOUSSETTA HALIMA
19D132
Docteur JAWHARI HOURIA

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
CREATININE SERIQUE	30
TRANSAMINASES GOT+GPT	100
Hb GLYCOSYLEE.HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1C	100
Total du (B)	B 230
Prise de sang (PC)	0,00 DH
Montant en DH	250,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de: **DEUX CENT CINQUANTE DIRHAMS**

*LABORATOIRE BAB DOUKKALA
Bd. Prince My Abdellah, Imrn. Bab Doukkala
Bloc A, Appt N°04 (1er étage) Marrakech 40000
Tél : 05 24 44 63 63 / 08 08 47 32 63
E-mail : laboratoire.essaadi@gmail.com*

Amarel® 1 mg

Glimépiride

Comprimé

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang. AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline produite par les cellules du pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2 lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

AMAREL 2 MG
CP 830

P.P.V. : 600DH40

118000060031

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Amarel® 1 mg

Glimépiride

Comprimé

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang. AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline produite par les cellules du pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2 lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

AMAREL 2 MG
CP 830

P.P.V. : 600DH40

118000060031



- modification du r
- prise de plus d'AMAREL
- fonction rénale d
- crise du diabète

de l'hypoglycémie, maux de tête, sommeil, faiblesse et de

difficulté à apprendre, vertiges, sensation de

• les signes suivants : anxiété, accélération cardiaque intenses, et soudaine (angine de poitrine et palpitations).

Si votre taux de sucre dans le sang est trop bas, l'état confusionnel immédiat peut survenir, ainsi qu'une respiration rapide et une perte de connaissance. Une attaque cérébrale peut survenir.

Traitements de l'hypoglycémie. Dans la plupart des cas, l'hypoglycémie disparaît après l'ingestion de sucre. Vous devez donc prendre contre, les édulcorants artificiels. Contactez votre médecin ou en cas de réapparition.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang doit être régulièrement. Votre médecin pour vérifier le nombre de tests.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris d'autres médicaments obtenu sans ordonnance, contactez votre pharmacien.

Votre médecin peut être informé de ce que vous prenez d'autres médicaments. L'effet d'AMAREL, comprimé peut être augmenté par les médicaments suivants :

- autres médicaments pour le diabète
- médicaments pour l'arthrite et l'ostéoporose
- azopropazone, oxyphénylamine
- médicaments pour les infections bactériennes à long terme
- médicaments pour la grippe et la rhinopharyngite
- chloramphénicol, fluconazole
- médicaments pour les maladies cardiaques et les maladies du cœur
- dérivés coumariniques
- médicaments favorisant l'hypoglycémie
- médicaments utilisés pour les maladies masculines ;

Amarel® 1 mg

Glimépiride

Comprimé

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang. AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline produite par les cellules du pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2 lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

AMAREL 2 MG
CP 830

P.P.V. : 600DH40

118000060031



- modification du r
- prise de plus d'AMAREL
- fonction rénale d
- crise du diabète

de l'hypoglycémie, maux de tête, sommeil, faiblesse et de

difficulté à apprendre, vertiges, sensation de

• les signes suivants : anxiété, accélération cardiaque intenses, et soudaine (angine de poitrine et palpitations).

Si votre taux de sucre dans le sang est trop bas, l'état confusionnel immédiat peut survenir, ainsi qu'une respiration rapide, une perte de connaissance et une attaque cérébrale.

Traitements de l'hypoglycémie. Dans la plupart des cas, l'hypoglycémie disparaît après l'ingestion de sucre. Vous devez donc prendre contre, les édulcorants artificiels. Contactez votre médecin ou en cas de réapparition.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang doit être régulièrement. Votre médecin pour vérifier le nombre de tests.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris d'autres médicaments obtenu sans ordonnance, contactez votre pharmacien.

Votre médecin peut être informé de ce que vous prenez d'autres médicaments. L'effet d'AMAREL, comprimé peut être augmenté par les médicaments suivants :

- autres médicaments pour le diabète
- médicaments pour l'arthrite et l'arthrose
- azopropazone, oxyphénylamine
- médicaments pour les infections bactériennes à long terme
- médicaments pour la grippe et le rhume
- chloramphénicol, flucloxacilline
- médicaments pour les maladies cardiaques et les maladies du cœur
- dérivés coumariniques
- médicaments favorisant l'hypoglycémie
- médicaments utilisés pour les maladies masculines ;

DERMOFIX® Poudre

Sertaconazole

84,20

..... 2 g
..... 100 g

Dermofix®
Sertaconazole
Poudre

PROMOPHARM S.A.



En général, c'est...
et d'éviter ainsi toute rechute, sachant que souvent cette guérison apparaît après 2 à 4 semaines de traitement.

EFFETS INDESIRABLES :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EMPLOI :

Après application de grandes quantités chez le nouveau né et chez la femme enceinte ou allaitante, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée dans ces cas.

PHYSIOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie topique.

Mycoses des plis : 1 application par jour

Pieds d'athlète : 1 application par jour

Il est conseillé d'appliquer la poudre non seulement au niveau des lésions mais également dans les chaussettes et les chaussures.

FORMES ET AUTRES PRESENTATIONS :

Dermofix® Poudre : Flacon de 30 g.

Dermofix® Crème à 2% : Tube de 30 g.

Dermofix® Solution à 2% : Flacon de 30 ml.

Dermofix® Gel à 2% : Flacon de 100 g.

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A).

PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/I FERRER INTERNATIONAL

Co
Se
Ex
Pr
Le
- le
- di
- ch
- ge
- ba
Indi
Trai
d'at
et
Eff
Le
réa
n'e

87,30

L C T 2 0 0 0 5

PER 0 4 / 2 3

F P V 8 7 D H 3 0

Dermofix® crème

Sertaconazole

PROMOPHARM S.A.



6 118000 240259

Caractéristiques particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophthalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix™ 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

DERMOFIX® Crème

Sertaconazole

2 g

100 g

ue à usage topique. Son spectre d'activité s'avère très large :
C. tropicalis, C. spp., Pithyrosporum orbiculaires)
(ophyton et Microsporum)
x (Aspergillus)
siques
Streptocoques)

perficielles de la peau telles que dermatophytoses : Tinea pedis (pied
giné de Hebra), Tinea corporis (Herpès circiné), Tinea barbae (Sycosis),
Minillose) et Pityriasis versicolore (Pityrosporum orbiculare).

cuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de
té. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications
traitement.



PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Lingagliptine)

28 comprimés pelliculés

BONTU S.A.

PPV: 374 DH 00

10010704/01



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Lingagliptine)

28 comprimés pelliculés

BONTU S.A.

PPV: 374 DH 00

10010704/01



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Lingagliptine)

28 comprimés pelliculés

BONTU S.A.

PPV: 374 DH 00

10010704/01