

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10174

Société : la source

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : mirri mohamed


Date de naissance : 1960

Adresse : ananas aden taxis 1 N 22

Tél. : 06.69.33.41.06 Total des frais engagés : ..... Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/12/2020

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : .....

.....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 21/12/2020      | Actes             | C2                    | 2000H                           | 2020-12-21<br>Hamid<br>Chirurgie<br>28/06/2020<br>13:15        |
|                 |                   |                       |                                 |  |
|                 |                   |                       |                                 |  |
|                 |                   |                       |                                 |  |

## EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur  | Date       | Montant de la Facture |
|---|------------|-----------------------|
|  | 21-12-2020 | 159,60                |

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Cœfficients | Montant des Honoraires |
|---|------|-----------------------------|------------------------|
|   |      |                             |                        |

## AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature<br>du Praticien | Date des<br>Soins | Nombre |    |    |    | Montant détaillé<br>des Honoraires |
|-------------------------------------|-------------------|--------|----|----|----|------------------------------------|
|                                     |                   | AM     | PC | IM | IV |                                    |
|                                     | .....             |        |    |    |    | .....                              |
|                                     | .....             |        |    |    |    | .....                              |
|                                     | .....             |        |    |    |    | .....                              |
|                                     | .....             |        |    |    |    | .....                              |

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

*Docteur SAMII HAMID*

## *Spécialiste de Neurochirurgie*

## *Spécialiste des maladies*

## *Du Cerveau et de la colonne vertébral*

*Ex. Attaché C.H.U Avicenne Rabat*

*Ex-Attaché C.H.U Timone Marseille*



الدكتور سليماني حميد ١٩٤٩

## إختصاصي في جراحة الدماغ

## الأعصاب والعمود الفقري

## دعا حسانة بمستشفى ابن سينا الباطنة

جراح محبی بمسنی بین میک امر باد

Berrechid , le

1.1962

بر شد، فی



061171765

## *ORDONNANCE*

NEAR  
No NAME

38, 40 <sup>?</sup> ~~Indirect Vis~~ S.V

A Pit S

PHARMACIE YASMINA  
71100 LE MANS  
HAY Yasmine Bétrechid  
Tél.: 02 52 53 31 88

6 Aug 1974

جامعة سوهاج  
S.V

B d Mohamed V Berrechid - 47 diour essafi 1<sup>er</sup> étage

Tél : 06 34 27 26 28 - 06 59 12 13 15

E-mail: mr.samii.hamid@gmail.com

شارع محمد الخامس برشيد 47 دبور الصافي طرابلس الالون  
الهاتف: 06 34 27 26 28 - 06 59 12 13 15

البريد الإلكتروني : [mr.samii.hamid@gmail.com](mailto:mr.samii.hamid@gmail.com)



# Laroxy

## Amitriptyline



# comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: ANTIDÉPRESSEUR / INHIBITEUR NON SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA MONOAMINE – code ATC : N06AA09

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments appelés antidépresseurs tricycliques. Ce médicament sert à :

- Soigner la dépression chez les adultes (épisodes dépressifs majeurs)
- Soulager les douleurs neuropathiques chez les adultes
- Prophylaxie des céphalées de tension chez les adultes
- Traitement de fond de la migraine chez les adultes
- Soigner l'enurésie (pipi au lit) nocturne chez les enfants de 6 ans et plus, uniquement lorsque des causes organiques, telles que spina bifida et troubles associés, ont été exclues et en l'absence de réponse à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, y compris les relaxants musculaires et la desmopressine. Ce médicament doit être prescrit uniquement par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'enurésie persistante.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROXYL 25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

#### Ne prenez jamais LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'amitriptyline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez récemment eu une attaque cardiaque (infarctus du myocarde)
- si vous avez eu des problèmes cardiaques tels que des troubles du rythme que l'on détecte à l'électrocardiogramme (ECG), un bloc cardiaque, ou une insuffisance coronarienne
- si vous prenez des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO).
- si vous avez pris des IMAO au cours des 14 derniers jours
- si vous avez pris du moclobémide la veille
- si vous souffrez d'une pathologie hépatique sévère.

Si vous êtes traité par LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, vous devez arrêter de prendre ce médicament et attendre 14 jours avant de commencer un traitement par IMAO.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

#### Énurésie nocturne

- Un ECG doit être pratiqué avant l'instauration du traitement par amitriptyline afin d'exclure un syndrome du QT long
- Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu'un médicament anticholinergique (voir également la rubrique 2 Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé)
- Des pensées et des comportements suicidaires peuvent également survenir en début de traitement par antidépresseurs pour des troubles autres que la dépression ; les mêmes précautions qu'avec les patients traités pour dépression doivent, par conséquent, être suivies lors du traitement de patients atteints d'enurésie.

#### Autres médicaments et LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé

Certains médicaments peuvent altérer l'action d'autres médicaments et cela peut parfois entraîner des effets indésirables graves.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, tel que :

- des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par ex. phénazine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide ou tranylcypromine (pour la dépression), ou sélégiline (pour la maladie de Parkinson). Ces médicaments ne doivent pas être pris en même temps que LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé (voir la rubrique 2 Ne prenez pas LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé),
- adrénaline, éphédrine, isoprénaline, noradrénaline, phényléphrine et phénylpropanolamine (ceux-ci peuvent être présents dans des médicaments contre la toux ou le rhume, et dans certains anesthésiques),
- des médicaments contre l'hypertension, par exemple des inhibiteurs des canaux calciques (par ex. diltiazem et vérapamil), guanéthidine, bétanidine, clonidine, réserpine et méthyldopa,
- médicaments anticholinergiques comme certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et des troubles gastro-intestinaux (par ex. atropine, hyoscyamine),
- thioridazine (pour la schizophrénie),
- tramadol (analgésique),
- médicaments contre les infections fongiques (par ex. fluconazole, terbinafine, kétocozaole et itraconazole),
- sédatifs (par ex. barbituriques),
- antidépresseurs (par ex. ISRS [fluoxétine, paroxétine, fluvoxamine], et bupropion),
- médicaments pour certaines maladies cardiaques (par ex. bêta-bloquants et antiarythmiques),
- cimétidine (contre les ulcères d'estomac),
- méthylphénidate (pour le TDAH),
- ritonavir (pour le VIH),
- contraceptifs oraux,
- rifampicine (pour les infections),
- phénytoïne et carbamazépine (pour l'épilepsie),
- millepertuis (hypericum perforatum), plante utilisée pour soigner la dépression
- médicaments pour la thyroïde.

Vous devez également informer votre médecin si vous prenez ou avez récemment pris un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, par ex.

• les médicaments pour soigner les rythmes cardiaques

# Xanax 0.5 mg®

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, si votre  
médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été prescrit  
même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient g  
mentionné dans cette notice, parlez-en

\* trouble de l'attention,

40,30

## 1. Composition du médicament

### Principe Actif :

Alprazolam.....,0,50 mg

### Excipients :

Lactose, Microcristalline cellulose, Docusate de sodium, Benzoate de sodium, Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200), Stéarate de magnésium, Amidon de maïs, Erythrose sodium aluminium laque.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose.

## 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N05BA12

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

## 3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gérants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 4. Posologie

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Réservez à l'adulte.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle. Dans tous les cas, conformez-vous à la prescription de votre médecin traitant.

### Mode et/ou voie d'administration

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

### Durée du traitement

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (cf. avertissements et précautions).

## 5. Contre-Indications

Ne prenez jamais Xanax 0,50 mg, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à l'alprazolam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 1 ;
- si vous avez une insuffisance respiratoire grave ;
- si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) ;
- si vous avez une insuffisance hépatique grave ;
- si vous avez une myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## 6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient :

Très fréquents (peuvent affecter plus d'une personne sur 10)

- dépression,
- sédation,
- somnolence,
- difficulté à coordonner certains mouvements,
- troubles de la mémoire,
- difficulté pour parler,
- étourdissements,
- mal de tête,
- constipation,
- fatigue,
- irritabilité.

Fréquents (peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 100)

- diminution de l'appétit,
- confusion,
- baisse ou augmentation de la libido,
- anxiété,
- insomnie,
- nervosité,
- troubles de l'équilibre,
- difficulté à coordonner certains mouvements,

- faiblesse musculaire,
- incontinence urinaire,
- cycles menstruels (régis) irréguliers,
- vomissements,
- excitation.

### Fréquence indéterminée

- excès de prolactine (hormone provoquant la lactation),
- agressivité,
- comportement hostile,
- pensée anormale,
- contractions musculaires involontaires (dystonie),
- trouble gastro-intestinal,
- hépatite,
- anomalies des paramètres hépatiques (modifications avec une atteinte du foie),
- ictere (jaunisse),
- réactions allergiques sévères (œdème de Quincke),
- photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil),
- rétention urinaire,
- œdème périphérique,
- augmentation de la pression dans l'œil.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

## 7. Mises en garde spéciales et précautions partielles

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre complètement le problème. Il va toutefois contribuer à lutter contre l'anxiété.

### Avertissements

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation régulière, il est possible que l'efficacité diminue.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner une dépendance physique et psychique. Diverses formes de dépendance peuvent se développer.

- durée du traitement,
- dose,

• antécédents d'autres dépendances médicamenteuses.

La dépendance peut survenir même en l'absence de symptômes de dépendance.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin.

Arrêtez BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer des réactions de sevrage.

Ceux-ci se caractérisent par l'apparition, en quelques jours, d'effets secondaires tels que l'anxiété importante, l'insomnie, douleurs musculaires, une irritabilité, une tension nerveuse, des maux de tête, des douleurs articulaires, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière et à la chaleur.

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être progressives.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'éviction de ce phénomène de sevrage. Cette période peut durer plusieurs semaines.

Malgré la décroissance progressive des doses, un arrêt progressif peut provoquer, à l'arrêt du traitement, avec une réapparition des symptômes initiaux, une réaction de sevrage.

Ceux-ci se caractérisent par l'apparition, en quelques jours, d'effets secondaires tels que l'anxiété importante, l'insomnie, douleurs musculaires, une irritabilité, une tension nerveuse, des maux de tête, des douleurs articulaires, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière et à la chaleur.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations d'apprentissage peuvent survenir.

Chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, ces réactions peuvent être graves.

Il est recommandé de faire une évaluation de l'efficacité et de la sécurité du médicament.

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, il est recommandé de faire une évaluation de l'efficacité et de la sécurité du médicament.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence.

en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire.

# Xanax 0.5 mg®

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, si votre  
médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été prescrit  
même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient g  
mentionné dans cette notice, parlez-en

\* trouble de l'attention,

40,30

## 1. Composition du médicament

### Principe Actif :

Alprazolam.....,0,50 mg

### Excipients :

Lactose, Microcristalline cellulose, Docusate de sodium, Benzoate de sodium, Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200), Stéarate de magnésium, Amidon de maïs, Erythrose sodium aluminium laque.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose.

## 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N05BA12

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

## 3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gérants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 4. Posologie

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Réservez à l'adulte.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle. Dans tous les cas, conformez-vous à la prescription de votre médecin traitant.

### Mode et/ou voie d'administration

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

### Durée du traitement

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (cf. avertissements et précautions).

## 5. Contre-Indications

Ne prenez jamais Xanax 0,50 mg, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à l'alprazolam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 1 ;
- si vous avez une insuffisance respiratoire grave ;
- si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) ;
- si vous avez une insuffisance hépatique grave ;
- si vous avez une myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## 6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient :

Très fréquents (peuvent affecter plus d'une personne sur 10)

- dépression,
- sédation,
- somnolence,
- difficulté à coordonner certains mouvements,
- troubles de la mémoire,
- difficulté pour parler,
- étourdissements,
- mal de tête,
- constipation,
- fatigue,
- irritabilité.

Fréquents (peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 100)

- diminution de l'appétit,
- confusion,
- baisse ou augmentation de la libido,
- anxiété,
- insomnie,
- nervosité,
- troubles de l'équilibre,
- difficulté à coordonner certains mouvements,

- faiblesse musculaire,
- incontinence urinaire,
- cycles menstruels (régis) irréguliers,
- vomissements,
- excitation.

### Fréquence indéterminée

- excès de prolactine (hormone provoquant la lactation),
- agressivité,
- comportement hostile,
- pensée anormale,
- contractions musculaires involontaires (dystonie),
- trouble gastro-intestinal,
- hépatite,
- anomalies des paramètres hépatiques (modifications avec une atteinte du foie),
- ictere (jaunisse),
- réactions allergiques sévères (œdème de Quincke),
- photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil),
- rétention urinaire,
- œdème périphérique,
- augmentation de la pression dans l'œil.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

## 7. Mises en garde spéciales et précautions partielles

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre complètement le problème. Il va toutefois contribuer à lutter contre l'anxiété.

### Avertissements

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation régulière, il est possible que l'efficacité diminue.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner une dépendance physique et psychique. Diverses formes de dépendance peuvent survenir.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin traitant. Arrêtez BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer des réactions de sevrage.

Ceux-ci se caractérisent par l'apparition, en quelques jours, d'anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, une irritabilité, une tension nerveuse, des maux de tête, des douleurs dans les extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière et à la chaleur. Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être progressives. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'éviction de ce phénomène de sevrage. Cette période peut durer plusieurs semaines.

Malgré la décroissance progressive des doses, un sevrage peut survenir, à l'arrêt du traitement, avec une réapparition des symptômes. Ces derniers peuvent justifier la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations d'apprentissage peuvent apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, ces troubles peuvent provoquer des réactions contraires à l'effet recherché (éveil, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la psychomotricité). Ces effets peuvent être potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même et/ou d'autrui, troubles du comportement et des actes automatiques).

La dose administrée devra faire l'objet d'un suivi chez les patients présentant des risques associés à la coordination des mouvements.

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, il est recommandé de consulter votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement des muscles, avec des conséquences souvent graves dans les situations d'urgence.

# Xanax 0.5 mg®

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir  
Si vous avez toute autre question, si votre  
médecin ou à votre pharmacien.  
Ce médicament vous a été prescrit  
même en cas de symptômes identiques.  
Si l'un des effets indésirables devient g  
mentionné dans cette notice, parlez-en

\* trouble de l'attention,

40,30

## 1. Composition du médicament

### Principe Actif :

Alprazolam.....,0,50 mg

### Excipients :

Lactose, Microcristalline cellulose, Docusate de sodium, Benzoate de sodium, Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200), Stéarate de magnésium, Amidon de maïs, Erythrose sodium aluminium laque.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose.

## 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N05BA12

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

## 3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gérants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 4. Posologie

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Réservez à l'adulte.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose usuelle. Dans tous les cas, conformez-vous à la prescription de votre médecin traitant.

### Mode et/ou voie d'administration

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

### Durée du traitement

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 8 à 12 semaines (cf. avertissements et précautions).

## 5. Contre-Indications

Ne prenez jamais Xanax 0,50 mg, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à l'alprazolam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 1 ;
- si vous avez une insuffisance respiratoire grave ;
- si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) ;
- si vous avez une insuffisance hépatique grave ;
- si vous avez une myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## 6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient :

Très fréquents (peuvent affecter plus d'une personne sur 10)

- dépression,
- sédation,
- somnolence,
- difficulté à coordonner certains mouvements,
- troubles de la mémoire,
- difficulté pour parler,
- étourdissements,
- mal de tête,
- constipation,
- fatigue,
- irritabilité.

Fréquents (peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 100)

- diminution de l'appétit,
- confusion,
- baisse ou augmentation de la libido,
- anxiété,
- insomnie,
- nervosité,
- troubles de l'équilibre,
- difficulté à coordonner certains mouvements,

- faiblesse musculaire,
- incontinence urinaire,
- cycles menstruels (régis) irréguliers,
- vomissements,
- excitation.

### Fréquence indéterminée

- excès de prolactine (hormone provoquant la lactation),
- agressivité,
- comportement hostile,
- pensée anormale,
- contractions musculaires involontaires (dystonie),
- trouble gastro-intestinal,
- hépatite,
- anomalies des paramètres hépatiques (modifications avec une atteinte du foie),
- ictere (jaunisse),
- réactions allergiques sévères (œdème de Quincke),
- photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil),
- rétention urinaire,
- œdème périphérique,
- augmentation de la pression dans l'œil.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

## 7. Mises en garde spéciales et précautions partielles

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre complètement le problème. Il va toutefois contribuer à lutter contre l'anxiété.

### Avertissements

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation régulière, il est possible que l'efficacité diminue.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner une dépendance physique et psychique. Diverses formes de dépendance peuvent survenir.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin.

Arrêtez BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer des réactions de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques jours, d'effets secondaires tels que l'anxiété importante, l'insomnie, douleurs musculaires, une irritabilité, une tension nerveuse, des maux de tête, des douleurs articulaires, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière et à la chaleur.

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être progressives. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'éviction de ce phénomène de sevrage. Cette période peut durer plusieurs semaines.

Malgré la décroissance progressive des doses, un arrêt brutal peut provoquer, à l'arrêt du traitement, avec une réapparition des symptômes initiaux, une réaction de sevrage.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations d'apprentissage peuvent survenir dans les heures qui suivent la prise du médicament. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Des réactions secondaires peuvent survenir chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, l'effet secondaire le plus courant est l'irritabilité. Ces effets secondaires peuvent être temporaires et peuvent disparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.