

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0043509

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11919 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : DINIA RACHID
Date de naissance : 18.11.1948
Adresse : Rue Abd Belhassen SLOUAZZANI Res. LOMA
Appt B6
Tél. : 0661409541 Total des frais engagés : 832,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 12/12/2020
Nom et prénom du malade : DINIA RACHID
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Adénome de prostate
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Rabat Le : 14/12/2020
Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-043509

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :
Nom de l'adhérent(e) :
Total des frais engagés :
Date de dépôt :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/10/2020	CS		2.000,00	Docteur LACHKAR Azzouz Professeur d'Urologie Chirurgien Urologue 46, Av. de France, N°4, Agdal Rabat - Tél: 05 37 77 00 22

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BELMAHJ Dr. Houssein EL HARIM (sp. BELMAHJ) 1, Rue Lénine, Av. Madagascar Dijon Jomra - Rabat Tél: 05 37 72 26 50	12/10/2020	637,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur LACHKAR Azzouz

Professeur d'urologie
Chirurgien Urologue

Ex professeur à la faculté de médecine-Rabat
Ex praticien hospitalier au CHU Ibn Sina-Rabat
Ex chirurgien urologue attaché au CHU de Rouen-France

Chirurgie des Reins, Voies Urinaires et génitales
Reins, Vessie, Prostate, Appareil génital
Calculs des voies urinaires - Lithotripsie extra corporelle
Cancérologie urologique et génitale
Stérilité masculine, Impuissance sexuelle, Circoncision
Endoscopie des voies urinaires

الدكتور لشقار عزوز

أستاذ جراحة المسالك البولية
إختصاصي في أمراض و جراحة الكلي و المسالك البولية والتناسلية

أستاذ سابق بكلية الطب - الرباط
جراح سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا - الرباط
جراح سابق بالمستشفى الجامعي بروان - فرنسا
جراحة الكلي، المسالك البولية و التناسلية
أمراض و جراحة البروستاتا
جراحة و تفتيت حصي الكلي و المسالك البولية
جراحة وعلاج سرطان الكلي، المسالك البولية والجهاز التناسلي
العقم عند الرجل ، العجز الجنسي، الختان
الفحص و العلاج بالمنظار

Rabat, le : 18.10.2020

m² Dimia Rectus

159,30 x 4

Fletuel :

14/12 x 120/20

(le son en concher)

637,20

PHARMACIE BELMAHI SARAU
صيدلية بن الماحي ش.م.م.
Dr. Hanae EL HARIM (ép. BELMAHI)
1, Rue Tonkin, Av. Madagascar
Dior Jamaâ- Rabat
Tél: 05 37 72 24 50

Docteur LACHKAR Azzouz
Professeur d'Urologie
Chirurgien Urologue
46, Av. de France, N°4, Agdal
Rabat - Tél: 05 37 72 24 50

Avenue de France, Résidence Atlas 46, Appt. N°4, Agdal - Rabat
Près de la station du Tramway « Avenue de France »

شارع فرنسا، إقامة الأطلس رقم 46 ، شقة رقم 4
قرب محطة طرامواي « شارع فرنسا » أكدال - الرباط

الهاتف : 0537 77 02 22

المحمول : 06 68 83 13 86

عن علاجكم.

الصيدلي.

لأنه يمكن أن يضر به.

الرجاء قراءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال هذه للتخزين.
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى أو أي شك اطلبوا المتناول و
إن هذا الدواء وصف لكم شخصيا لا تعطوه لشخص
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون لقراءتها من

مدة العلاج:

يجب التقيد بوصفة الطبيب.

في حالة الإفرط في جرعة فلوترال® أقراص ذات تحرر:

اتصلوا فوراً بالطبيب أو الصيدلي أو أقرب مستشفى.

في حالة الإفرط في الجرعة، يتم إدخال المريض للمستشفى
ويبقى في وضعية استلقاء ويتم إعطاؤه العلاج المعروف
لانتفاخ ضغط الدم.

نظرا لتثبيته البروتيني المرتفع، فإنه يكون من الصعب تصفية
الألفيزوزين.

إذا نسيت تناول فلوترال® ، لا تتناولوا جرعة مضاعفة
للتعويض عن الجرعة التي فاتكم.

4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن لفلوترال® أقراص تستعمل لفترات
طويلة أن يتسبب في بعض التأثيرات الغير المرغوب فيها، لكن
لا تحصل لدى الجميع.

شائعة جدا :

- دوخة، شعور بالدوار، شعور بالضيق، صداع في الرأس،
- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وآلام في
البطن،
- شعور بالإرهاق.

شائعة قليلا :

- دوخة، غثاء، إغماء (فقدان مفاجئ للوعي)،
- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الانتقال من وضعية
الاستلقاء إلى وضعية الوقوف،
- ضربات القلب السريعة ، خفقان،
- إسهال،
- جفاف الفم،
- انسداد الأنف أو سيلان (التهاب مخاطية الأنف)،
- ظهور طفح جلدي أو حكة،
- وذمة بالأم في الصدر،
- احمرار الوجه.

نادرة جدا :

- ذبحة صدرية لدى المرضى الذين كانوا يعانون في السابق
من أمراض القلب التاجية (أنظر الفقرة "يرجى الحذر
مع")،
- شرى، تورم مفاجئ في الجسم، الوجه و / أو العنق والتي
يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس وتشكل خطرا على
المريض (وذمة وعائية).

وتيرها غير معروفة :

- أمراض الكبد (التهاب الكبد الفيروسي)، وخاصة بسبب
انسداد القنوات الصفراوية،
- انتصاب مؤلم ويوم لفترة طويلة،
- قرحية متوجة خلال عملية جراحية للساد (الماء الأبيض
في العين) (أنظر فقرة "يجب الحذر عند")،
- عدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني)،
- التقيؤ،
- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الخلايا
المتعادلة).

إذا لاحظتم آثار جانبية لا ترد ضمن هذه النشرة أو إذا تفاقمتم
إحدى الآثار الجانبية، أطلعوا الطبيب أو الصيدلي.

5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

يحتفظ به بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

من شروط معينة للتخزين.

بهذه النشرة

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة
يستعمل؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال®
أقراص ذات تحرر ممتد ؟
3. كيفية تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة يستعمل؟

فلوترال® يحتوي على الألفيزوزين الذي ينتمي إلى فئة
حاصرات ألفا.
هذه الأدوية تعمل على الجهاز التناسلي البولي والهرمونات
الجنسية.

فلوترال® يستعمل في:

- علاج الأعراض الوظيفية للتضخم الحميد للبروستات.
- علاج مساعد على تفريغ المثانة عند الاحتباس الحاد للبول
المرتبطة بالتضخم الحميد للبروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

لا يجب تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد في الحالات
التالية:

- حساسية شديدة للألفيزوزين و/أو لأحد المكونات الأخرى.
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.
- قصور كبد.
- قصور كلوي شديد (تصفية الكرياتينين <30 مل/الدقيقة).
- إذا كنتم تتناول بعض الأدوية المستعملة في علاج فيروس
نقص المناعة البشرية (مثل مثبث بروتياز مشترك بريتونايفير أو
كوبيسيسيتا) أو الأدوية المستعملة في علاج التهاب الكبد من نوع
C (مثل تيلابروفيرون أو بوسيبروفيرون) أو الأدوية المستعملة في
علاج بعض الأمراض الفطرية (مثل كيتوكونازول،
إيتراكونازول، بوزاكونازول)، أو تلك المستعملة في علاج
بعض الالتهابات البكتيرية (مثل كلاريثروميسين،
إيريثروميسين، تيليثروميسين) أنظر الفقرة "تناول أو استعمال
أدوية أخرى".

يجب الانتباه مع فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد :

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال :

قبل بدء العلاج: يرجى إخبار طبيبك إذا كنتم تعاني من مرض
مرتبط بالقلب (وخاصة إذا كنتم تعاني من الذبحة الصدرية أو
فشل حاد بالقلب أو اضطرابات ضربات القلب)، أو إذا كان لديكم
من قبل انخفاض كبير في ضغط الدم باستعمال دواء آخر من
نفس فصيلة فلوترال (حاصرات ألفا).

خلال فترة العلاج

يمكن ظهور هبوط في الضغط الدموي بعد تناول هذا الدواء
مصحوبا بالأعراض التالية : الإحساس بالدوران، غثاء و
تعرق. في هذه الحالة يجب على المريض الاستلقاء إلى حين
اختفاء هذه الأعراض.

هذه الأعراض غالبا ما تكون عابرة وفي بداية العلاج ولا يجب
توقيف العلاج بسببها ويجب إخبار المريض بإحتمالية وقوعها.
يجب الحذر خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يأخذون
دواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو يأخذون مشتقات النترات
(الأدوية الخاصة بالذبحة الصدرية).
ينبغي تجنب أخذ هذا الدواء مع
الأدوية المستعملة
الضغط

عن علاجكم.
الصيدلي.
لأنه يمكن أن يضر به.

الرجاء قراءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال هذه للتخزين.
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى أو أي شك اطلبوا المتناول و
إن هذا الدواء وصف لكم شخصيا لا تعطوه لشخص
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون لقراءتها من

مدة العلاج:

يجب التقيد بوصفة الطبيب.
في حالة الإفرط في جرعة فلوترال® أقراص ذات تحرر:
اتصلوا فوراً بالطبيب أو الصيدلي أو أقرب مستشفى.
في حالة الإفرط في الجرعة، يتم إدخال المريض للمستشفى
ويبقى في وضعية استلقاء ويتم إعطاؤه العلاج المعروف
لانتفاخ ضغط الدم.
نظرا لتثبيته البروتيني المرتفع، فإنه يكون من الصعب تصفية
الألفيزوزين.

إذا نسيت تناول فلوترال® ، لا تتناولوا جرعة مضاعفة
للتعويض عن الجرعة التي فاتكم.

4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن لفلوترال® أقراص تستعمل لفترات
طويلة أن يتسبب في بعض التأثيرات الغير المرغوب فيها، لكن
لا تحصل لدى الجميع.

شائعة جدا :

- دوخة، شعور بالدوار، شعور بالضيق، صداع في الرأس،
- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وآلام في
البطن،
- شعور بالإرهاق.

شائعة قليلا :

- دوخة، غشاش، إغماء (فقدان مفاجئ للوعي)،
- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الانتقال من وضعية
الاستلقاء إلى وضعية الوقوف،
- ضربات القلب السريعة ، خفقان،
- إسهال،
- جفاف الفم،
- انسداد الأنف أو سيلان (التهاب مخاطية الأنف)،
- ظهور طفح جلدي أو حكة،
- وذمة (آلام في الصدر،
- احمرار الوجه.

نادرة جدا :

- ذبحة صدرية لدى المرضى الذين كانوا يعانون في السابق
من أمراض القلب التاجية (أنظر الفقرة "يرجى الحذر
مع")،
- شرى، تورم مفاجئ في الجسم، الوجه و / أو العنق والتي
يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس وتشكل خطرا على
المريض (وذمة وعائية).

وتيرها غير معروفة :

- أمراض الكبد (التهاب الكبد الفيروسي)، وخاصة بسبب
انسداد القنوات الصفراوية،
- انتصاب مؤلم ويوم لفترة طويلة،
- قرحية متوجة خلال عملية جراحية للساد (الماء الأبيض
في العين) (أنظر فقرة "يجب الحذر عند")،
- عدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني)،
- التقيؤ،
- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الخلايا
المتعادلة).

إذا لاحظتم آثار جانبية لا ترد ضمن هذه النشرة أو إذا تفاقمتم
إحدى الآثار الجانبية، أطلعوا الطبيب أو الصيدلي.

5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

يحتفظ به بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.
من شروط معينة للتخزين.

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة
يستعمل؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال®
أقراص ذات تحرر ممتد ؟
3. كيفية تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة يستعمل؟

فلوترال® يحتوي على الألفيزوزين الذي ينتمي إلى فئة
حاصرات ألفا.
هذه الأدوية تعمل على الجهاز التناسلي البولي والهرمونات
الجنسية.

فلوترال® يستعمل في:

- علاج الأعراض الوظيفية للتضخم الحميد للبروستات.
- علاج مساعد على تفريغ المثانة عند الاحتباس الحاد للبول
المرتبطة بالتضخم الحميد للبروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

لا يجب تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد في الحالات
التالية:

- حساسية شديدة للألفيزوزين و/أو لأحد المكونات الأخرى.
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.
- قصور كبد.
- قصور كلوي شديد (تصفية الكرياتينين < 30 مل/الدقيقة).
- إذا كنت تتناول بعض الأدوية المستعملة في علاج فيروس
نقص المناعة البشرية (مثل مثبط بروتياز مشترك بريتونايفير أو
كوبيسيسيتا) أو الأدوية المستعملة في علاج التهاب الكبد من نوع
C (مثل تيلابروفيرون أو بوسيبروفيرون) أو الأدوية المستعملة في
علاج بعض الأمراض الفطرية (مثل كيتوكونازول،
إيتراكونازول، بوزاكونازول)، أو تلك المستعملة في علاج
بعض الالتهابات البكتيرية (مثل كلاريثروميسين،
إيريثروميسين، تيليثروميسين) أنظر الفقرة "تناول أو استعمال
أدوية أخرى".

يجب الانتباه مع فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد :

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال :

قبل بدء العلاج: يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مرض
مرتبط بالقلب (وخاصة إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية أو
فشل حاد بالقلب أو اضطرابات ضربات القلب)، أو إذا كان لديك
من قبل انخفاض كبير في ضغط الدم باستعمال دواء آخر من
نفس فصيلة فلوترال (حاصرات ألفا).

خلال فترة العلاج

يمكن ظهور هبوط في الضغط الدموي بعد تناول هذا الدواء
مصحوبا بالأعراض التالية : الإحساس بالدوران، غثاء و
تعرق. في هذه الحالة يجب على المريض الاستلقاء إلى حين
اختفاء هذه الأعراض.

هذه الأعراض غالبا ما تكون عابرة وفي بداية العلاج ولا يجب
توقيف العلاج بسببها ويجب إخبار المريض بإحتمالية وقوعها.
يجب الحذر خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يأخذون
دواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو يأخذون مشتقات النترات
(الأدوية الخاصة بالذبحة الصدرية).
ينبغي تجنب أخذ هذا الدواء مع
الأدوية الأخرى المستعملة
الضغط

عن علاجكم.
الصيدلي.
لأنه يمكن أن يضر به.

الرجاء قراءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال هذه للتخزين.
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى أو أي شك اطلبوا المتناول و
إن هذا الدواء وصف لكم شخصيا لا تعطوه لشخص
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون لقراءتها من

مدة العلاج:

يجب التقيد بوصفة الطبيب.
في حالة الإفرط في جرعة فلوترال® أقراص ذات تحرر:
اتصلوا فوراً بالطبيب أو الصيدلي أو أقرب مستشفى.
في حالة الإفرط في الجرعة، يتم إدخال المريض للمستشفى
ويبقى في وضعية استلقاء ويتم إعطاؤه العلاج المعروف
لانتفاخ ضغط الدم.
نظرا لتثبيته البروتيني المرتفع، فإنه يكون من الصعب تصفية
الألفيزوزين.

إذا نسيت تناول فلوترال® ، لا تتناولوا جرعة مضاعفة
للتعويض عن الجرعة التي فاتكم.

4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن لفلوترال® أقراص تستعمل لفترات
طويلة أن يتسبب في بعض التأثيرات الغير المرغوب فيها، لكن
لا تحصل لدى الجميع.

شائعة جدا :

- دوخة، شعور بالدوار، شعور بالضيق، صداع في الرأس،
- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وآلام في
البطن،
- شعور بالإرهاق.

شائعة قليلا :

- دوخة، غشاش، إغماء (فقدان مفاجئ للوعي)،
- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الانتقال من وضعية
الاستلقاء إلى وضعية الوقوف،
- ضربات القلب السريعة ، خفقان،
- إسهال،
- جفاف الفم،
- انسداد الأنف أو سيلان (التهاب مخاطية الأنف)،
- ظهور طفح جلدي أو حكة،
- وذمة (آلام في الصدر،
- احمرار الوجه.

نادرة جدا :

- ذبحة صدرية لدى المرضى الذين كانوا يعانون في السابق
من أمراض القلب التاجية (أنظر الفقرة "يرجى الحذر
مع")،
- شرى، تورم مفاجئ في الجسم، الوجه و / أو العنق والتي
يمكن أن تسبب صعوبة في التنفس وتشكل خطرا على
المريض (وذمة وعائية).

وتيرها غير معروفة :

- أمراض الكبد (التهاب الكبد الفيروسي)، وخاصة بسبب
انسداد القنوات الصفراوية،
- انتصاب مؤلم ويوم لفترة طويلة،
- قرحية متوجة خلال عملية جراحية للساد (الماء الأبيض
في العين) (أنظر فقرة "يجب الحذر عند")،
- عدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني)،
- التقيؤ،
- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الخلايا
المتعادلة).

إذا لاحظتم آثار جانبية لا ترد ضمن هذه النشرة أو إذا تفاقمتم
إحدى الآثار الجانبية، أطلعوا الطبيب أو الصيدلي.

5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

يحتفظ به بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.
من شروط معينة للتخزين.

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة
يستعمل؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال®
أقراص ذات تحرر ممتد ؟
3. كيفية تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
4. ما هي الآثار الغير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يحفظ فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد وفي أية حالة يستعمل؟

فلوترال® يحتوي على الألفيزوزين الذي ينتمي إلى فئة
حاصرات ألفا.
هذه الأدوية تعمل على الجهاز التناسلي البولي والهرمونات
الجنسية.

فلوترال® يستعمل في:

- علاج الأعراض الوظيفية للتضخم الحميد للبروستات.
- علاج مساعد على تفرغ المثانة عند الاحتباس الحاد للبول
المرتبطة بالتضخم الحميد للبروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد ؟

لا يجب تناول فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد في الحالات
التالية:

- حساسية شديدة للألفيزوزين و/أو لأحد المكونات الأخرى.
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.
- قصور كبد.
- قصور كلوي شديد (تصفية الكرياتينين < 30 مل/الدقيقة).
- إذا كنتم تتناول بعض الأدوية المستعملة في علاج فيروس
نقص المناعة البشرية (مثل مثبط بروتياز مشترك بريتونايفير أو
كوبيسيسيتا) أو الأدوية المستعملة في علاج التهاب الكبد من نوع
C (مثل تيلابروفيرون أو بوسيبروفيرون) أو الأدوية المستعملة في
علاج بعض الأمراض الفطرية (مثل كيتوكونازول،
إيتراكونازول، بوزاكونازول)، أو تلك المستعملة في علاج
بعض الالتهابات البكتيرية (مثل كلاريثروميسين،
إيريثروميسين، تيليثروميسين) أنظر الفقرة "تناول أو استعمال
أدوية أخرى".

يجب الانتباه مع فلوترال® أقراص ذات تحرر ممتد :

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال :

قبل بدء العلاج: يرجى إخبار طبيبك إذا كنتم تعاني من مرض
مرتبط بالقلب (وخاصة إذا كنتم تعاني من الذبحة الصدرية أو
فشل حاد بالقلب أو اضطرابات ضربات القلب)، أو إذا كان لديكم
من قبل انخفاض كبير في ضغط الدم باستعمال دواء آخر من
نفس فصيلة فلوترال (حاصرات ألفا).

خلال فترة العلاج

يمكن ظهور هبوط في الضغط الدموي بعد تناول هذا الدواء
مصحوبا بالأعراض التالية : الإحساس بالدوران، غثاء و
تعرق. في هذه الحالة يجب على المريض الاستلقاء إلى حين
اختفاء هذه الأعراض.

هذه الأعراض غالبا ما تكون عابرة وفي بداية العلاج ولا يجب
توقيف العلاج بسببها ويجب إخبار المريض بإحتمالية وقوعها.
يجب الحذر خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يأخذون
دواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو يأخذون مشتقات النترات
(الأدوية الخاصة بالذبحة الصدرية).
ينبغي تجنب أخذ هذا الدواء مع
الأدوية المستعملة
الضغط