

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LÉS REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ctions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

phacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

Nº P19- 0026360

ND 53839

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 309521

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EDDERBAUGH MAHJOUBA

Date de naissance : 1976

Adresse : HAY MOULAY ABBELLAIT N° 98 RUE 44 Casablanca

Tél. : 0664450688 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/10/2020

Nom et prénom du malade : EDDERBAUGH MAHJOUBA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés dans la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :


Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/09/2020			Grosfil	
13/10/2020	C2	300.000		

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <p>Pharmacie Bennane 2-4, Bd. Boulmane Bab Mu Abdellah Ain Chak Casablanca Tél: 05 22 87 43 21 Tineb BENNANI SMF</p>	13-10-2020	1927,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
25533411	11433553



(Création, remont, adjonction)

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	Coefficient DES TRAVAUX
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ----- 00000000 00000000 35533411 11433553 G B	<input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
MONTANTS DES SOINS		<input type="text"/>
DATE DU DEVIS		<input type="text"/>

Docteur JABRI Leila

Spécialiste en Endocrinologie

Diabète et Métabolisme

Maladies Métaboliques

Diplômée de la Faculté
de Médecine de NICE

Diplômée en Echographie
Thyroïdienne - Université Paris Descartes

الدكتورة جبري ليلى

اختصاصية في مرض السكري

أمراض الغدد الصماء - أمراض الأيض

خريجة كلية الطب بنينيس بفرنسا

حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى
للغدة الدرقية

13 Octobre 2020

Casablanca, le الدار البيضاء في

Mme ED DEBBAGH MAHJOURA

152,50 X 3

1) LANTUS SOLOSTAR 5 STYLO 100U

26 U le matin pd 3 mois

75

2) NOVORAPIDE FLEXPEN

6 U le matin

75

6 U le midi

4 U le soir

pd 3 mois

57110

3/ Aiguilles BD microfines + 4 mm

2 Boites.

56,80

4) Cure 20.000 (2 Boite)

75

99,60

100P115j (3a)

Dr. JABRI LEILA
Spécialiste en Endocrinologie
diabétologie et Métabolisme
Assakane Al Anik 405 - 3ème Etage
Bd El Qods Ain Chok Casablanca
Tél: 05 22 50 66 06

75

5) Additif insulinique
1 gel pd 1 ml

1927,80

macie Boulimane
Dr. Boulimane
Abdelkhalil Ain Chok
Assakane Al Anik 405 - 3ème Etage
Bd El Qods Ain Chok Casablanca
Tél: 05 22 50 66 06
Zineb BENNANI SMILES

شارع القدس إقامة الصفا تجئة السكن الانبياء رقم 18 الطابق الثالث الدار البيضاء

Bd El Qods, Résidence SAFFA, lotissement Assakan Al Anik, Imm 405 - 3ème étage N° 18 - Casablanca

Tél.: 05 22 50 66 06 - Email : diabeto.jabri@gmail.com

valable 3 mois

Le 13.10.2020

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Dr Sabri Leila

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Ed delbagh Mahjoub

Présente

Diabète typ 2 - HTA

Nécessitant un traitement d'une durée de :

3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)

site : www.mupras.com // mail : pec@mupras.com // tel : 0522-20-45-45 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18

Adresse : Center d'affaire Allal Ben Abdellah, 49, Angle Rue Allal Ben Abdellah et Rue Mohammed Fakir
6ème Etage. Casablanca





مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 29-09-2020 – 2009290035 – Mme Mahjouba EDDEBBAGH

20-09-2018

25OH-Vitamine D total (D2+D3)
(Technique ELFA – VIDAS Biomérieux)


28,0 ng/ml

(30,0-100,0)

22,7

Valeurs de référence :

- Carence: < à 10 ng/ml
- Insuffisance : entre 10 et 29 ng/ml
- Suffisant : entre 30 et 100 ng/ml
- Toxicité : > à 100 ng/ml



Validé par : Dr Hoda OUALI ALAMI

Dr. Hoda OUALI ALAMI
MÉDECIN BIOLOGISTE
LABORATOIRE EL KHALIL
252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock
Tél: 05 22 52 62 52 / Fax: 05 22 21 10 90



Date du prélèvement : 29-09-2020
Code patient : 1505070022
Né(e) le : 01-01-1946 (74 ans)

Mme Mahjouba EDDEBBAGH
Dossier N° : 2009290035
Prescripteur : Dr LEILA JABRI



BIOCHIMIE SANGUINE


08-06-2020

Glycémie à jeun

(Technique enzymatique- AU 480 BECKMAN)

1,06 g/L (0,70–1,10)
5,88 mmol/L (3,89–6,11)

1,12



08-06-2020

Hémoglobine glyquée (HbA1c) (Tosoh Biosciences GX – HPLC)

7,2 % (4,0-6,0)


7,3

Variant Hémoglobine

Absence de variant d'hémoglobine

Valeurs de référence :

- Sujet normoglycémique : 4,00 à 6,00 % de l'hémoglobine totale.
 Sujet diabétique équilibré : objectif ciblé autour de 6,50 %.
 Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8,50 %.



**Dr. Neda DBALI ALAMI
MEDECIN BIOLOGISTE
LABORATOIRE EL KHALIL
252, Bd Elkhazil, Hay R'y Abdellah, Ain Chock
TÉL: 05.22.52.62.52 / FAX: 05.22.71.10.90**

Prélèvement à domicile sur Rendez-vous

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca

Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhall@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com

Patente : 34046060 - I.F. : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - ICE : 001603906000091

Docteur JABRI Leila

Spécialiste en Endocrinologie

Diabétologie

Maladies Métaboliques

Diplômée de la Faculté
de Médecine de NICE

Diplômée en Echographie

Thyroïdienne - Université Paris Des Cartes

الدكتورة جبرى ليلا

اختصاصية في مرض السكري

أمراض الغدد الصم - أمراض الايض

خريجة كلية الطب بنينس بفرنسا

حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى

للغدة الدرقية

Casablanca, le

28/09/2025 الدار البيضاء في

me EDDEBBAGH
Nahjouba

(Go)

— H8AN —

— vit —

LABORATOIRE EL KHALIL
Mme EDDEBBAGH Nahjouba

Né(e) le : 01-01-1946 F



2009290035

A coller sur l'ordonnance

ORDO

Dr. JABRI LEILA
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Maladies Métaboliques
Rsa Sallal Al Anik, Imm 405 - 3ème étage
44, El Code Al Chouf, Casablanca
Tél : 05 22 60 66 06
INPE : 091166002

LABORATOIRE EL KHALIL
2009290035
2009290035
2009290035
2009290035

شارع القدس إقامة الصفا تجزئة السكن الانيك عمارة 405 رقم 18 الطابق الثالث الدار البيضاء

Bd El Qods, Résidence SAFFA, lotissement Assakan Al Anik, Imm 405 - 3ème étage N° 18 - Casablanca

Tél.: 05 22 50 66 06 - Email : diabeto.jabri@gmail.com



INPE :



093061166

FACTURE N° : 2009290035

Casablanca le 29-09-2020

Mme Mahjouba EDDEBBAGH

Demande N° 2009290035

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0439	Vitamine D	B450	B

0

Total des B : 580

TOTAL DOSSIER : 700.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : **sept cents dirhams**

	Clefs
0	B
0	B
0	B

LABORATOIRE EL KHALIL
 Dr. Hoda OUALI ALAMI
 MEDICIN BILOGISTE
 252, Bd EL KHALIL , Hay My Abdellah, Ain Chok, Casablanca- Tél : 0522526252 / FAX:
 0522211090

	Clefs
0	B
0	B
0	B

252, Bd. EL KHALIL , Hay My Abdellah, Ain Chok, Casablanca- Tél : 0522526252 / FAX:
 0522211090

E-Mail : labo.elkhalil@gmail.com - Patente N : 34046060 - I.F.N : 15214903 - CNSS : 4204096

ICE : 001603906000091



Multivitamines · Minéraux
Oligo-Éléments

+ Extrait de Ginseng

Complément alimentaire,
ce n'est pas un médicament

Pourquoi les vitamines, minéraux et oligo-éléments sont importants pour notre organisme?

ADDITIVA Vital est un complément alimentaire précieux, constitué essentiellement de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'extrait de Ginseng.

Ces substances nutritives essentielles soutiennent le fonctionnement de l'organisme humain et entrent de façon générale, à l'image des hydrates de carbone, des protéines et des lipides, dans la composition des aliments que nous absorbons chaque jour.

Ils sont indispensables à la vie et certains ne peuvent être remplacés par rien. Un apport quotidien suffisant est indispensable.

Un besoin accru de même qu'un déficit peuvent apparaître un jour ou l'autre et affectent plusieurs de ces éléments nutritifs majeurs.

Sont concernés en premier lieu les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les sportifs, les personnes qui travaillent à la force, etc. Mais d'autres personnes peuvent être affectées, telles que les personnes qui mangent peu, celles qui sont sous l'influence de certains médicaments, ou dont les repas pris la plupart du temps à la cantine ou au restaurant, favorisent une alimentation déséquilibrée. Sont enfin et fréquemment concernées les personnes qui sont sujets à un régime ou qui doivent suivre des cures d'amaigrissement.

Aujourd'hui, pour pouvoir affronter les agressions de la vie quotidienne, il faut faire face à un état de stress constant. Cela nécessite parfois un apport accru qui lui permet de préserver sa résistance et sa survie.

99,00 Dh

Notice: Information de l'utilisateur

D-CURE 25 000 UI; solution buvable; boîte de 4 ampoules.

D-CURE 2 400 UI; solution buvable en gouttes; flacon de 10 ml.

Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice. Vous devrez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure?
3. Comment prendre D-Cure?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver D-Cure?
6. Information supplémentaires.

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé?

Classe pharmacothérapeutique:

Vitamines.

Indications thérapeutiques :

D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Carences en vitamine D : rachitisme, ostéomalacie ;
- Prévention de l'ostéoporose,
- Apport insuffisant de vitamine D : obstruction biliaire, les personnes âgées (alités ou sortant peu), cirrhose, ablation partielle ou totale de l'estomac, augmentation de graisse fécales.
- Traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants.
- État pathologique dû à un défaut de sécrétion des glandes parathyroïdiennes d'origine inconnue ou opératoire, familiale à prédominance féminine.

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés à la rubrique "Ingrédients"
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.
- Si votre urine présente une teneur trop élevée en calcium en particulier lorsque des calculs rénaux sont présents.

Avertisements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre D-CURE.

- La vitamine D sera administrée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale, une lithiasie ou une hypertension calcémique sont plus importants.
- Il y a lieu de vérifier la phosphatémie.
- Suspendre le traitement en cas de symptômes dus à l'excès en vitamine D : fatigue, nausées, diarrhées, augmentation du volume urinaire.
- L'utilisation de fortes doses de vitamine D suppose un contrôle étroit de la teneur en calcium dans le sang et/ou de la tension artérielle.
- La prudence s'impose chez les patients sous médicaments apparentés à la digitaline.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments ».

Autres médicaments et D-Cure :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- La phénytoïne (médicament utilisé dans l'épilepsie), le phénobarbital (somnifère), la carbamazépine, la prymidine pris durant des périodes prolongées peuvent accélérer le cycle dans l'organisme du calciféryl (= forme majeure circulante de la vitamine D).
- Un traitement aux glucocorticoïdes pourrait altérer le métabolisme de la vitamine D.

La diminution de la teneur en calcium dans le sang par excès de vitamine D sont accrues chez les patients sous médicaments apparentés à la digitaline. Les doses de vitamine D et de calcium (qui par ailleurs peut être nécessaire) augmentent le risque d'une augmentation de la teneur en calcium dans le sang.

D-CURE* AMPOULE



6 118001 3 00080

PPV: 56.30 DH

LOT: 20F18B

EXP: 06/2022

Notice :
Information pour l'utilisateur



**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargin**

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

<MAT>542989



Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Respectez attentivement les recommandations du médecin concernant la glycémie (mesures d'analyses de sang et d'urine) et l'activité physique (tous les jours). Si votre glycémie est trop élevée, suivez les conseils en cas d'urgence indiqués dans l'encadré à la fin de cette notice.

Voyages

Avant de partir en voyage, pour vous informer sur :

- disponibilité de votre médicament dans les pays que vous allez,
- fourniture d'insuline dans ces pays,
- conservation adéquate de l'insuline pendant le voyage,
- horaire des repas et des repas pendant le voyage,
- effets possibles du changement horaire,
- nouveaux risques éventuels dans les pays visités,
- ce que vous devez faire en cas d'urgence lorsque vous êtes malade.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat-RP1,
Ain sebaâ Casablanca
Lantus 100U/ml, inj b6 sty
P.P.V : 744,50 DH



6 118001

08 1615

(hyperglycémie).

- Si vous ne vous nourrissez pas suffisamment, votre glycémie risque de diminuer (hypoglycémie).

NovoRapid® FlexPen®

100 U/ml,
Solution injectable en stylo prérempli

Insuline asparte

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si un quelconque effet indésirable devient sérieux ou si vous ressentez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que NovoRapid® et dans quel cas est-il utilisé ?

NovoRapid® est une insuline moderne (anologue de l'insuline) d'action rapide. Les insulines modernes sont des versions améliorées de l'insuline humaine.

NovoRapid® est utilisé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 1 an. Le diabète est une maladie au cours de laquelle votre organisme ne produit pas assez d'insuline pour contrôler votre taux de sucre dans le sang.

NovoRapid® commence à faire baisser votre taux de sucre dans le sang 10 à 20 minutes après l'injection, son effet maximum apparaît 1 à 3 heures après l'injection et l'effet dure de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d'action NovoRapid® doit normalement être associé à des insulines d'action intermédiaire ou d'action prolongée. De plus, NovoRapid® peut être utilisé par perfusion continue à l'aide d'une pompe.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NovoRapid® ?

N'utilisez jamais NovoRapid®

- Si vous êtes allergique à l'insuline asparte ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, Autres informations).
- Si vous suspectez une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) imminente (voir section 3, Comment utiliser NovoRapid®).
- Si votre FlexPen® est tombé, a été endommagé ou a été écrasé.
- S'il n'a pas été conservé correctement ou s'il a été congelé (voir rubrique 5, Comment conserver NovoRapid® ?).
- Si l'insuline n'a pas été utilisée dans les deux mois suivant l'ouverture de la flaconneuse.

Avant d'utiliser

- Contrôlez l'étiquette. Assurez-vous que l'heure d'utilisation indiquée sur l'étiquette correspond à l'heure actuelle. N'utilisez pas la flaconneuse si l'heure indiquée sur l'étiquette est antérieure à l'heure actuelle.
- Utilisez toujours la flaconneuse pour l'injection. N'utilisez pas la flaconneuse pour l'injection si l'heure indiquée sur l'étiquette est antérieure à l'heure actuelle.
- Les aiguilles et les seringues doivent être utilisées une seule fois et doivent être jetées immédiatement après l'injection.

NovoRapid® FlexPen®

-- LAPROPHAN --

PPV : 5710H00

6 118001 121304

Faites attention avec NovoRapid®

- Si vous avez des problèmes de reins, de foie, de glandes surrénales, d'hypophyse ou de thyroïde.
- Si vous faites plus d'efforts physiques que d'habitude ou si vous voulez modifier votre régime alimentaire habituel, car ceci peut modifier votre taux de sucre dans le sang.
- Si vous êtes malade : continuez à prendre votre insuline et consultez votre médecin.

Notice : **Information pour l'utilisateur**



Lantus® SoloStar®

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargine**

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
 3. Comment utiliser Lantus
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Si votre glycémie est trop faible (hypoglycémie), suivez les conseils en cas d'hypoglycémie (voir l'encadré à la fin de cette notice).

Voyages

Avant de partir en voyage, consultez votre médecin pour vous informer sur les points suivants :

- disponibilité de votre insuline dans le pays où vous allez,
 - fourniture d'insuline, d'aiguilles, etc.,
 - conservation adéquate de votre insuline pendant le voyage,
 - horaire des repas et des injections d'insuline pendant le voyage,
 - effets possibles du changement de fuseau horaire,
 - nouveaux risques éventuels pour votre santé dans les pays visités,
 - ce que vous devez faire dans les situations d'urgence lorsque vous vous sentez souffrant ou malade.

Maladies et blessures

Dans les situations suivantes, la prise en charge de votre diabète peut nécessiter beaucoup de précautions (par exemple d'adapter la dose d'insuline, les analyses de sang et d'urine) :

- Si vous êtes malade ou souffrez d'une blessure importante, votre glycémie risque d'augmenter (hyperglycémie).
 - Si vous ne vous nourrissez pas, votre glycémie risque de diminuer (hypoglycémie).

Dans la plupart des cas vous allez voir un médecin. **Veillez à contacter votre médecin.**

Medecin:
Si vous souffrez de diabète de type 1 (diabète insulinodépendant), n'arrêtez pas votre insuline et continuez de prendre suffisamment de glucides. Prévenez toujours les personnes qui s'occupent

- tous les types de diabète
- les inhibiteurs de la pompe à protons (IEP) utilisés dans le traitement des maladies cardiaques
- le disopropiophénazine, une maladie mentale
- la fluoxéthamine, un psychotrope
- les fibrate, pour les taux élevés de cholestérol
- les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (utilisés dans le traitement de l'anxiété)
- la pentoxifyline (tels que les médicaments utilisés pour soulager les symptômes de la maladie d'Alzheimer)
- les antidiététiques

Les médicaments peuvent entraîner une augmentation de l'hyperglycémie

- les cortis
 - pour tra
 - le dana
 - le diazo
 - artériel
 - les diur
 - l'hypert
 - excessiv
 - le glucos
 - traiter c
 - l'isoniazi
 - les œstri
 - pilule co
 - les dériv
 - des mala
 - la somat
 - les médic

Notice : Information pour l'utilisateur



Lantus® SoloStar®

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glarginé**

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
 3. Comment utiliser Lantus
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Si votre glycémie est trop faible (hypoglycémie), suivez les conseils en cas d'hypoglycémie (voir l'encadré à la fin de cette notice).

Voyages

Avant de partir en voyage, consultez votre médecin pour vous informer sur les points suivants :

- disponibilité de votre insuline dans le pays où vous allez,
 - fourniture d'insuline, d'aiguilles, etc.,
 - conservation adéquate de votre insuline pendant le voyage,
 - horaire des repas et des injections d'insuline pendant le voyage,
 - effets possibles du changement de fuseau horaire,
 - nouveaux risques éventuels pour votre santé dans les pays visités,
 - ce que vous devez faire dans les situations d'urgence lorsque vous vous sentez souffrant ou malade.

Maladies et blessures

Dans les situations suivantes, la prise en charge de votre diabète peut nécessiter beaucoup de précautions (par exemple d'adapter la dose d'insuline, les analyses de sang et d'urine) :

- Si vous êtes malade ou souffrez d'une blessure importante, votre glycémie risque d'augmenter (hyperglycémie).
 - Si vous ne vous nourrissez pas, votre glycémie risque de diminuer (hypoglycémie).

Dans la plupart des cas vous allez voir un médecin. **Veillez à contacter votre médecin.**

Medecin:
Si vous souffrez de diabète de type 1 (diabète insulinodépendant), n'arrêtez pas votre insuline et continuez de prendre suffisamment de glucides. Prévenez toujours les personnes qui s'occupent

- tous les types de diabète
- les inhibiteurs de l'enzyme convertase de la coagulation (IEC) (utilisés dans le traitement de la maladie cardiaque)
- le disopropiophénazine (utilisé dans le traitement de certaines maladies psychiatriques)
- la fluoxétine (utilisée dans le traitement de certains troubles mentaux)
- les fibrate (utilisés dans le traitement des maladies cardiaques)
- les inhibiteurs de la pompe à protons (utilisés dans le traitement de certains ulcères et de l'acidité)
- la pentoxifyline (tels que le lidocaine et la lidocaïne) (utilisées pour soulager la douleur)
- les antidiéabetiques

Les médicaments peuvent entraîner une augmentation de l'hyperglycémie

- les cortis
 - pour tra
 - le dana
 - le diazo
 - artériel
 - les diur
 - l'hypert
 - excessiv
 - le glucos
 - traiter c
 - l'isoniazi
 - les œstri
 - pilule co
 - les dériv
 - des mala
 - la somme
 - les médic

Notice : Information pour l'utilisateur



Lantus® SoloStar®

**100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glarginé**

SANOFI

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Lantus et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lantus
 3. Comment utiliser Lantus
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Si votre glycémie est trop faible (hypoglycémie), suivez les conseils en cas d'hypoglycémie (voir l'encadré à la fin de cette notice).

Voyages

Avant de partir en voyage, consultez votre médecin pour vous informer sur les points suivants :

- disponibilité de votre insuline dans le pays où vous allez,
 - fourniture d'insuline, d'aiguilles, etc.,
 - conservation adéquate de votre insuline pendant le voyage,
 - horaire des repas et des injections d'insuline pendant le voyage,
 - effets possibles du changement de fuseau horaire,
 - nouveaux risques éventuels pour votre santé dans les pays visités,
 - ce que vous devez faire dans les situations d'urgence lorsque vous vous sentez souffrant ou malade.

Maladies et blessures

Dans les situations suivantes, la prise en charge de votre diabète peut nécessiter beaucoup de précautions (par exemple d'adapter la dose d'insuline, les analyses de sang et d'urine) :

- Si vous êtes malade ou souffrez d'une blessure importante, votre glycémie risque d'augmenter (hyperglycémie).
 - Si vous ne vous nourrissez pas, votre glycémie risque de diminuer (hypoglycémie).

Dans la plupart des cas vous allez voir un médecin. **Veillez à contacter votre médecin.**

Medecin:
Si vous souffrez de diabète de type 1 (diabète insulinodépendant), n'arrêtez pas votre insuline et continuez de prendre suffisamment de glucides. Prévenez toujours les personnes qui s'occupent

- tous les
- le diabète
- les inhibiteurs de l'enzyme convertisseur de l'angiotensine (IEC) (utilisés dans la maladie cardiaque)
- le disopropiophénazine (utilisé dans certaines maladies psychiatriques)
- la fluoxépine (utilisée dans certains troubles mentaux)
- les fibrate (utilisés dans la maladie cardiaque)
- les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (utilisés dans certains troubles mentaux)
- la pentoxifyline (tels que le mal de l'altitude et le syndrome d'apnée du sommeil)
- les soulageants de la douleur
- les antidiététiques

Les médicaments peuvent entraîner une augmentation de l'hyperglycémie

- les cortis
 - pour tra
 - le dana
 - le diazo
 - artériel
 - les diur
 - l'hypert
 - excessiv
 - le glucos
 - traiter c
 - l'isoniazi
 - les œstri
 - pilule co
 - les dériv
 - des mala
 - la somat
 - les médic