

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-409082

ND: 53862

Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricule : **2538**

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom : **KACHANI MUSTAPHA**

Date de naissance : **01/01/1951**


Adresse : **JAMILA 5 Rue 187 N° 29 Cite Djemaa CASA 04**

Tél. : **0667028896**

Total des frais engagés : **342,60** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **26/06/2011**

Nom et prénom du malade : **Hawa Kachen**

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : **H.T.A**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements rapportés dans la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/10/20	G	150 ch	INP : 091042721	<i>DR. CHABBI Faicel</i> Médecin Généraliste - Echographie Générale Jadis / Rue 1A N° 82 Cité Djemaa 22229 16.31

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>B</i>	26/10/20	192,68.

ANALYSES - RADIGRAPHIES








Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Designation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

	DES TRAVAUX <input type="text"/>									
	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>									
	DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>									
	FIN D'EXECUTION <input type="text"/>									
O.D.F PROTHESES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433582</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>	H	25533412	21433582	D	00000000	00000000	G	35533411	11433553
H	25533412	21433582								
D	00000000	00000000								
G	35533411	11433553								
	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>									
	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>									
	DATE DU DEVIS <input type="text"/>									
	DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>									
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION									

Docteur CHRAÏBI Faïcel

الدكتور الشرابي فيصل



- Médecine Générale
- Médecin du travail
- Echographie (Echodoppler Couleur)
- ECG

- الطب العام

- طب الشغل

- الفحص بالصدى

- التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le

26/10/20 الدار البيضاء في

Mme Rachida Khachya

64 ans X3
Anamnèse plus cp
10 ml x 3 mois

5



Fax 1946

DR. CHRAÏBI FAÏCEL
MÉDECIN GÉNÉRAL
ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE
JAMILA 7 RUE 14 N°82
CITÉ DJEMÂA
CASABLANCA 20220
TÉL: 05 22 29 16 31

جميلة 7 زنقة 14 رقم 82 قرية الجماعة - الدار البيضاء - الهاتف . 05 22 29 16 31
Jamila 7, Rue 14 N°82 , Cité Djemâa - Casablanca - Tél.: 05 22 29 16 31

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient à effet notable : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie. Goutte. Anurie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voir ordonnance.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (50mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous prenez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est désconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà ou si vous gérez un traitement de l'usage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez ou avez eu une infection urinaire, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves cardiaques ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez une régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats perturbés aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et/ou de signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous-hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacie tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales communément associées à l'effet de l'antagonisme des diurétiques épargniers de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peuvent provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antialgésiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codépridine ou un sel de calcium. Certains neurotropiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus.Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion.Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématocrite et de l'hémoglobine.

Pas fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémorragie, Anorexie, goûte Anxiété, peur panique, confusion, réflexes anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire.Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, transpiration, migraine, synapse Vision trouble, sensation de brûlure ou de piqûre dans les yeux, dyspnée, Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngie, laryngie, dyspnée, bronchite, rhinité, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire.Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance.Œdème du visage, Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse: Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

CONDUTTE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier au début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prés.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose à.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



PER : 64/20
LOT : 133
PEV : 06/23

30 comprimés pelliculés

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil-Casablanca-

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).
Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

Excipient à effet notoire : Lactose.

CLASSE PHARMACO-THERAPETIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hyponatrémie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Aneury.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminiée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec les agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques épargeurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la ciclopiprane ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements, toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctrite et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rives anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Névrose, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinité, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, constipation, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bousffure de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de la peau non-mélanome :

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des doses excessives (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

CONSEILS ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions.

- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose à propos de ce médicament.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I. Tit Mellil -Casablanca-

100mg
25mg
un comprimé

50mg
12,5mg
un comprimé

64/20/2014

130/02/2014

130/02/2014

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique).

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hyponatrémie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Arthrite.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves auriculaire ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez sous un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques épargneurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithium pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoides. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des analgésiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la ciclopore ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements, toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématocrite et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, réflexes anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, parasthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypertension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, alopécie, dermatite, érythème, boutfesses de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de la peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminé par hémodialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a priori.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

CECI EST UN MÉDICAMEN

LOT : 132
PER : 06/23
PPV : 64,20 DH

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés

6 118000 141051



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I₂ Tit Mellil -Casablanca-