

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.


Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° P19- 049224

ND: 53582

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent

Matricule : 1041

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : 3

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 61 08 31 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Mohamed BEN ELAYYAR
Chirurgie Orthopédique
et Traumatologie
180, Bd. Oued Sebou, Wiam,
Casablanca - Tel. 0646 546 648

Date de consultation : - 7 DEC. 2020

Nom et prénom du malade : Nadir Aïcha Idriss El Badi Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Gonalgie bilatérale

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
- 7 DECEMBRE 2020	Cs		300,-	Dr. Mohamed BEN EL AYFAR Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 180, Bd. Oued Sebou. Wiam, Casablanca - Tél 0646.546.648


EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournis ^{te}	Date	Montant de la Facture
pharmacie TAM Dr. Bennani Jaafar Bd Oued Sebou - Oule ^e CASABLANCA Tél: 0527 80 18 99	07/18/2023	5431.90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>RADILOGIE HABIB SIDI ADELLAH Immeuble 10 route d'Azemour 22900 Sidi Abderrahmane Route d'Azemour 22900 Sidi Abderrahmane ex : 05 22 90 10 10 05 22 90 07 01 13 13</i>	20/12/20	$2 \frac{1}{23} + 2 \frac{1}{23}$	460,00 DHS

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Seins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
 ARSAQUI Yassir Lotoissement Assimba Bd Abdou Roudiou - Hay Massal Tel: 06 4000 5141 GSM : (+212) 06 50 133 659	26/12/2020	20				20x150 = 3000,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d'explorations.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

VISÃO DE SAGUARO: ESTUDO DE CASO DE INVESTIMENTO NA REDE

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed BEN EL AYFAR
 Spécialité en Chirurgie
 Orthopédique et Traumatologie

- Ancien Chirurgien au CHP Lieutenant Mohamed Baouafi - Casablanca
- Ancien Chirurgien au CHU Averroès Casablanca

Sur rendez-vous

الدكتور بن العيفر محمد

أخصائي في جراحة و تقويم العظام و المفاصل

جراح سابقاً بالمركز الإستشفائي محمد بوافي الدار البيضاء

جراح سابقاً بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

بالموعد

14 Novembre 2020 à l'hopital El Baoul
 Casablanca le 21/12/2020



Pharmacie TAM

Dr. Bennani Jaafar
 302, Bd. Oued Sebou - Oulf.
 CASABLANCA
 Tél: 0522 90 18 99

1000 Doulcer

1 - 0

1000 Doleut

0 - 0



99,50 Curart. gel (x 2)

3 gélifications



370 Duralastan

2 - 2



- 2 pol 7/

421,20 x 2 Calcrifix D3



- 1 pol 30/

549,50

Dr. Mohamed BEN EL AYFAR
 Chirurgie Orthopédique
 et Traumatologique
 180, Bd. Oued Sebou Wiam,
 Casablanca - Tel: 0646 646 648

180 ، شارع واد سبو، إقامة سعد ، الطابق الأول ، شقة 2 ، حي الوئام ، الدار البيضاء

180, Bd. Oued Sebou, Résidence Saad, 1er Etage Appt 2 - Quartier Wiam - Casablanca

الهاتف : 05 400 93 100 / 0646 646 648

الاستعجالات : 06 72 74 74 01

DULASTAN®

500 mg / 2 mg

دوالستان®

علبة من 20

Boîte de 20 comprimés

37100

DULASTAN®

500 mg / 2 mg

دوالستان®

علبة من 20 قرصاً

Boîte de 20 comprimés

37100

ATTENTION

DANS

Ce m

- d'hyp

- de gros

- d'allaitement,

- d'insuffisance hépatocellulaire,

- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,

- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, prolongées.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans les autres médicaments pris.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients souffrant d'insuffisance rénale et/ou hépatique.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement prescrire un autre médicament.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements exceptionnels.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'OPINION D'UN MEDECIN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose, à la malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactase. L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE MEDICAMENTS, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'admettre.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique dans le sang. La glycémie peut être mesurée par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

110068-03

LOT : 19182
 PER : 07/2022
 PPV : 102,00 DH

- Ce médicament n'est pas destiné à être pris par quelqu'un d'autre, sauf si ce médicament est nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

• Composition en substance active :

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthyléneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolimeroesteres) Acrili.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthyléneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

• Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). AULCER® peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

• Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel > 10 kg

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents.

Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. POSOLOGIE :

Voie d'administration : voie orale.

Veillez à toujours prendre **AULCER®** en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez les prendre, combien de temps vous devez les prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en complément.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre acide est trop élevé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre des doses supplémentaires si votre acide est toujours trop élevé.
- La dose usuelle une fois que votre acide est sous contrôle est de 10 mg une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé par l'acide, la dose recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac (ulcère duodénal) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre des doses supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre des doses supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère de l'estomac) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre des doses supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Vous pouvez augmenter la dose à 40 mg (2 gélules) une fois par jour si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Prévention des ulcères de l'estomac et de l'œsophage :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous prescrire une combinaison d'amoxicilline, de clarithromycine et de sucralfate.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac et dans le pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour.

Votre médecin peut ajuster la dose et également de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

Utilisation chez l'enfant :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien et régurgitations acides :

Les enfants âgés de plus de 1 an et avec un poids corporel > 10 kg.

AULCER® :

La posologie dépendra de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères de l'estomac et de l'œsophage :

Helicobacter pylori.

- Les enfants âgés de plus de 4 ans et avec un poids corporel > 10 kg. La posologie dépendra du poids de l'enfant et le médicament sera administré.

Votre médecin prescrira à votre enfant une combinaison d'amoxicilline et de clarithromycine.

Mode d'administration :

- Il est recommandé de prendre vos gélules avec de l'eau.

Les gélules peuvent être prises au petit déjeuner.

Elles doivent être avalées entières avec de l'eau.

~~DOLENIO 589 mg~~

60 comprimés pelliculés



gardez cette notice, vous pourrez la relire.

- Si vous avez toute autre question, doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DOLENIO 589 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLENIO 589 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre DOLENIO 589 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLENIO 589 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DOLENIO 589 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

DOLENIO appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux

EXP:

12/2021

Lot:

AP0299001

FPU: 190DH

gr
ent

4220



Lis.
Elle co.
Si vous avez d'autres que...
pharmacien.
Ce médicame...
symptômes /
Gardez cet

...formations à votre médecin ou à votre

...t'autre, même en cas de



421,20

DÉNOMIN

CALCIFIX®

COMPOS

Carbonate

Cholécalcif

Excipients

* mélange

FORME PH

Boîte de 30

500 mg

400 UI

... q.s.p. un comprimé
et d'amidon de maïs.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en calcium et en vitamine D,
- en association aux traitements de l'ostéoporose, lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou à l'un des constituants,
- immobilisation prolongée,
- quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
- élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
- calculs rénaux (lithiasie calcique),
- phénylcétoneurie (maladie héréditaire due à un déficit enzymatique), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Casablanca, le 07/12/2020

IF : 2221555

Facture N° 3910/12/2020

Nom patient : EL BAOD AICHA

Examen(s) réalisé(s) : RX 2 GENOUX EN CHARGE F/P

Date Examen(s) : 07/12/2020

Montant : 460 DH

Montant Produits : 0,00 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MONTANT TOTAL :
QUATRE CENT SOIXANTE DIRHAMS

10, Imm. Communale. Angle route d'Azemmour et Bd. Sidi Abderrahmane - Casablanca

Tél. : 05 22 90 10 10 / 05 22 90 07 07 - Fax : 05 22 93 37 13

Pantente : 35 00 38 66 - TVA : 73 39 10 - ICE : 001686337000022

Docteur Mohamed BEN EL AYFAR
Spécialité en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie

- Ancien Chirurgien au CHP Lieutenant Mohamed Baouafi - Casablanca
- Ancien Chirurgien au CHU Averroès Casablanca

Sur rendez-vous

الدكتور بن العيفر محمد
أخصائي في جراحة و تقويم العظام و المفاصل

جراح سابقاً بالمركز الإستشفائي محمد بوعزيز الدار البيضاء
جراح سابقاً بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

بالموعد

M^{me} Nadia Aïcha veue Elbaad Casablanca le - 7 DEC 2020.

Rex des genoux en charge

F H

RADIOLOGIE HAY HASSANI ANFA
Immeuble Communal Route
Route d'Azemour et Bd. Sidi Abderrahmane
Tél.: 05 22 90 10 10/05 22 90 07 07 - Cas
Fax : 05 22 93 34 13

Dr. Mohamed BEN EL AYFAR
Chirurgie Orthopédique
et Traumatologie
180, Bd. Oued Sebou, Wiam,
Casablanca - Tél. 0646.646.648

Docteur Mohamed BEN EL AYFAR
Spécialité en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie

- Ancien Chirurgien au CHP Lieutenant Mohamed Baouafi - Casablanca
- Ancien Chirurgien au CHU Averroès Casablanca

Sur rendez-vous

الدكتور بن العيفر محمد
أخصائي في جراحة و تقويم العظام و المفاصل

جراح سابق بالمركز الإستشفائي محمد بوافي الدار البيضاء
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

بالموعد

Casablanca le

21/12/2020

Mme Nadia Aïche ep El Basd'

Patiente ve patiente
grand fils frère de
20 séances de Kinésithérapie

Cabinet de Kinésithérapie
ARS 701 Yassir
Lotissement 5 J. Jami Rue 20 N°7
Bd. Abou El Oued - Hay Hassani
Tél: 06 400 1116
GSM : (+212) 06 50 133 659

Dr. Mohamed BEN EL AYFAR
Chirurgie Orthopédique
et Traumatologie
180 Bd. Oued Sebou Wiam,
Casablanca - Tél. 0646 646 648

180 ، شارع واد سبو ، إقامة سعد ، الطابق الأول ، شقة 2 ، حي الوئام ، الدار البيضاء
180, Bd. Oued Sebou, Résidence Saad, 1er Etage Appt 2 - Quartier Wiam - Casablanca
الهاتف : 05 400 93 100 / 0646 646 648 المستعجلات : 06 72 74 74 01
Urgences : 06 72 74 74 01



Lot : 395294

À consommer de
préférence avant le : 12 / 2024

P.P.C : 99,50 DH

Yassir ARSAOUI

Diplômé de l'Académie de Moscou
Kinésithérapie - Electrothérapie
Gymnastique Médicale
Massages Médicaux



عرساوي ياسير

خريج أكاديمية موسكو

الترويض الطبي - المعالجات الكهربائية
الرياضة الطبية - التدليك الطبي

Casablanca, le 24/12/2020

DEVIS

Je soussigné, M. Yassir ARSAOUI, certifie que

Mme NHARI AÏCHA veuve EL BAOD

nécessite 20 séances de rééducation pour :

ostéopathie bilatérale

sur prescription du Docteur : BEN EL AYFAR

et ceci à raison de 150 dirhams la séance.

Total : 20 x 150 = 3000,00 MAD

Cabinet de Kinésithérapie
ARSAOUI Yassir
Lotissement Missimi Rue 20 N°7
Bd. Abou Regrag Hay Hassani
Tél : +212 540 001 116
GSM : +212 650 133 659

Lotissement Missimi - Rue 20 n°7 - Bd. Abou Regrag Hay Hassani Casablanca - MAROC
Tél : +212 540 001 116 • GSM : +212 650 133 659

IF n°51453019 - Patente n°35020137 - CNSS n°7272785



Dr. O. Alami

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

Dr. N. Faris

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

07/12/2020

PATIENT : Mme.EL BAOD AICHA
MEDECIN TRAITANT : DR MOHAMED BEN EL AYFAR
EXAMEN(s) REALISE(s) : RX 2 GENOUX EN CHARGE F/P

Cher Docteur,
Je vous remercie de nous avoir adressé votre patiente dont voici le résultat de l'examen.

Rx DEUX GENOUX FACE ET PROFIL EN CHARGE

- ✓ Augmentation de la transparence osseuse probablement en rapport avec une ostéopénie.
- ✓ Pincement tibio fémoral interne bilatéral.
- ✓ Ostéophytose condylienne et tibiale interne, bilatérale, rotulienne postérieure.
- ✓ Présence de calcifications à projection articulaire : Corps étrangers intra articulaires ?

AU TOTAL

Gonarthrose bilatérale.

Confraternellement
DR N.FARIS