

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIFE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

en cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ctique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº P19- 058191

53956

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

## Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 2185

Société : R.A.M.  
R.A.M.-  
69

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TOUIL Abderrahim

Date de naissance : 25-5-1953

Adresse : Hay El Raspid (B) N 331 Cas

Tél. 0695248176

Total des frais engagés : 194,60 t. 200 p.m. Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. NAJIB TLEMCANI  
MEDECINE GENERALE  
271, Bd. Reda GHEDIRIA  
(Ex.NIL) - Cité DJEMAA  
Casablanca - Tél: 022 38 72 21

Date de consultation : 08 DEC 2020

Nom et prénom du malade : TOUIL ISRAA

Age: 29/3

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

AFK - gastrite (N.V. e)

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 08/12/2020

Signature de l'adhérent(e) :

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES			
Date d'effectuation des Actes	Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
08/06/2020	C	1	800 / 1012

**Cachet du Pharmacien  
ou du Fournisseur**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Efficacité 125, rue Jeanne d'Arc 75018 Paris	8.12.20	199,60

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION


O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

271, Bd Reda Ghedira  
(Ex. NIL) - Cite Djemaa  
Casablanca  
Tél: 05 22 38 72 21



271، شارع رضى اكديرة  
(النيل سابقا) - قرية الجماعة  
الدار البيضاء  
الهاتف: 05 22 38 72 21

Casablanca le : ..... 0.8. DEC. 2020 ..... الدار البيضاء في :

N° 2 TOUL ISRAA

- Induktan inj  
3590 m  $\times$  3/1

- Clonidine 500 µg  
7990 m  $\times$  3/1

- Flagyl inj  
3290 m  $\times$  3/1

- Doliprane 300 mg  
1285 m  $\times$  4/1

- Ulkotin suppo + salut  
3810 m  $\times$  4f- AMR

199.60

Dr. NAJIB TLEMCANI  
MEDECINE GENERALE  
271 Bd. Reda GHEDIRA  
(Ex NIL) Cite DJEMAA  
Casablanca - Tél: 022 38 72 21

PHARMACIE NASSER  
Hay El Fida Jd Rue 48 N° 11  
Tel: 05 22 38 72 21



# INDUCTAN®

granulés pour suspension buvable en flacon  
Trimébutine

- Veuillez lire attentivement :**
- Gardez cette notice, vous pouvez la faire parvenir à un autre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été prescrit pour leur être nocif, même si les symptômes sont atténués.
  - Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, ceci s'applique aussi à tout médicament.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE INDUCTAN® EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INGREDIENTS ?
3. COMMENT PRENDRE INDUCTAN® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
5. COMMENT CONSERVÉR INDUCTAN® ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

**1. QU'EST-CE QUE INDUCTAN® EST-IL UTILISÉ ?****ANTISPASMODIQUE MUSCULAIRE**

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

**2. QUELLES SONT LES INGREDIENTS ?****granulés pour suspension buvable**

Si votre médecin vous a indiqué ce médicament.

Ne prenez jamais INDUCTAN® sans avis de votre pharmacien.

Si vous êtes allergique à la trimébutine, consultez la rubrique 6.

Ne donnez pas ce médicament à un enfant sans avis de votre pharmacien.

EN CAS DE DOUCEUR, IL EST PRÉFÉRABLE DE CONSULTER VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec INDUCTAN®.

**Mises en garde**

Ce médicament contient un agent allergisant.

pour les enfants entre 2 ans et 6 ans.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée en cas de malabsorption du glucose et du galactose.

Pour les enfants de plus de 5 ans.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée en cas de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 6 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

**Pour les adultes :**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 9 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

**Précautions d'emploi**

En cas de diabète, tenir compte de la teneur en sucre : 5 ml contiennent 3 g de saccharose.

EN CAS DE DOUCEUR NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et allaitement**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Informations importantes concernant certains composants de INDUCTAN®, granulés pour suspension buvable en flacon :**

Liste des excipients à effet notable : saccharose, jaune orangé S.

**3. COMMENT PRENDRE INDUCTAN®, granulés pour suspension buvable en flacon ?**

E

à soupe 3 fois par jour.

Selon l'effet recherché, cette posologie peut être augmentée jusqu'à 6 Cuillerées à soupe par jour.

# DOLIPRANE®

100 mg suppositoire sécable  
150 mg suppositoire (de 8 /  
200 mg suppositoire (de 12 /  
300 mg suppositoire (de 15 /

## COMPOSITION QUALITATIVE ET

Doliprane 100 mg : paracétamol  
Doliprane 150 mg : paracétamol  
Doliprane 200 mg : paracétamol  
Doliprane 300 mg : paracétamol

Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides

## FORME PHARMACEUTIQUE

Doliprane 100 mg suppositoire sécable ..... Boîte de 10 suppositoires  
Doliprane 150 mg suppositoire ..... Boîte de 10 suppositoires  
Doliprane 200 mg suppositoire .....  
Doliprane 300 mg suppositoire .....  
  
صحيحة

## CLASSE PHARMACO-THERAPE

ANTALGIQUE - ANTIPIRETIQUE  
(N: Système nerveux central)

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MED

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs modérées que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

صالح لغاية 01/23 ROC PPV 38.10 DH

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol
- Maladie grave du foie
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre «posologie»)

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler la prise de Doliprane à votre médecin en cas de prescription de dosage de l'acide urique sanguin ou de la glycémie.

4 %

SANOFI

### INFORMATION DU MEDICAMENT

#### Présentation :

FLAGYL 4 POUR CENT, suspension buvable.

#### **c) Composition :**

Benzoate de métronidazole ..... 4 g.  
Excipients : phosphate monosodique dihydraté, hydroxybenzoate de méthyle, hydroxybenzoate de propyle, silicoaluminate de magnésium spécial (veegum), saccharose, saccharine sodique dihydratée, alcool éthylique à 95 pour cent v/v, essence concentrée de citron, essence d'orange douce déterpenée, eau purifiée q.s.p 100 ml.

Une cuillère-mesure de 5 ml correspond à une dose unitaire de 200 mg de métronidazole (benzoate).

#### **c) Forme pharmaceutique et présentation :**

Suspension buvable, Flacon de 120 ml avec cuillère-mesure de 5 ml.

#### **d) Classe pharmaco-thérapeutique :**

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTÉRIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5-imidazolés.

### **2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

### **3. ATTENTION !**

#### **a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :**

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas d'allergie aux médicaments de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfirame ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

b) Mises en garde :  
La prise de ce médicament peut entraîner des réactions indésirables telles que des vomissements. Il convient de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, d'apparition de vertiges ou de confusion.

- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques qui évoluent.

Attention ! Ce médicament contient de l'alcool. Le titre alcoolique de la suspension est de 1%, soit 40 mg d'alcool par cuillère-mesure.

• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

#### **c) Précautions d'emploi :**

- En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir votre médecin en cas de survenue de troubles nerveux (fourmillements, difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions).
- En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, ou de grossesse.
- Ce médicament contient 3 g de saccharose par cuillère-mesure: en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou diabète.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

FLAGYL 4%  
SUSP BUV FL 120 ML  
P.P.V : 32DH90



6 118000 060390

500 mg/62,50 mg

## ENFANT



sachet(s) ..... fois par jour à prendre de préférence au début des repas, pendant ..... jours.

كيس ... مرات في اليوم، من الأفضل قبل الأكل، مدة ... يوم.

Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPV : 79,90 DH

LOT : 623736

PER : 06/21



**CLAVULIN** 500mg/62,50mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon de 30ml  
**CLAVULIN** 100mg/12,50mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon de 60ml  
**CLAVULIN** 500mg/62,50mg ENFANTS, poudre pour suspension buvable en sachet-dose  
 Amoxicilline/Acidé clavulanique

gsk

### Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament est généralement prescrit pour un bébé ou un enfant. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Sommaire notice

#### Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?
- COMMENT PRENDRE CLAVULIN ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER CLAVULIN ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### Classe pharmacothérapeutique

CLAVULIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

##### Indications thérapeutiques

CLAVULIN est utilisé chez les nourrissons et les enfants pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLAVULIN ?

##### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

##### Contre-indications

###### Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- S'il est allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans CLAVULIN.
- S'il a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- S'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
- En cas de doute, demandez conseil à son médecin ou au pharmacien avant d'administrer CLAVULIN.

##### Précautions d'emploi : misez en garde spéciales

###### Faites attention avec CLAVULIN :

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant de lui administrer ce médicament s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'a pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer CLAVULIN à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN ou un autre médicament.

###### Réactions nécessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant prend CLAVULIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

##### Tests sanguins et urinaires

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier(e) qui prend CLAVULIN. En effet, CLAVULIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

##### Interactions avec d'autres médicaments

###### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin

- CLAVULIN contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Cette-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylcétonurie ».
- CLAVULIN contient de la maltodextrose (glucose). Si votre médecin vous a dit que votre enfant a une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- CLAVULIN contient du potassium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.
- CLAVULIN contient du sodium : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

#### 3. COMMENT PRENDRE CLAVULIN ?

##### Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

##### Posologie

###### Adultes et enfants de 40 kg ou plus

- Ces formes (sachets et suspension) ne sont généralement pas recommandées pour les adultes et les enfants pesant 40 kg ou plus. Demandez conseil à votre médecin ou au pharmacien.

###### Enfants pesant moins de 40 kg

Toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité de CLAVULIN à administrer à votre bébé ou enfant.
- Une seringue graduée en plastique est fournie (pour la forme suspension). Vous devez l'utiliser pour administrer la dose correcte à votre bébé ou enfant.
- Dose habituelle : 40 mg/5 mg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.

###### Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- Si votre enfant a des problèmes rénaux, une réduction de la dose peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- Si votre enfant a des problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de son foie.

###### Comment administrer CLAVULIN

- Pour la suspension : Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.
- Pour le sachet : Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu en un verre d'eau.
- Donnez ce médicament à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant.
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes de votre enfant persistent, consultez de nouveau un médecin.

###### Symptômes et instructions en cas de surdosage

###### Si vous avez administré plus de CLAVULIN que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive de CLAVULIN par votre enfant peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en au médecin de votre enfant le plus tôt possible. Menez la boîte de médicament au médecin.

###### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

###### Si vous oubliez de donner CLAVULIN à votre enfant :

Si vous avez oublié de donner une dose à votre enfant, administrez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de lui administrer la dose suivante.