

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 0002859

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☒ Autres 54589

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 745 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : RETRAITE
Nom & Prénom : DEZAIRI BEN SALEM
Date de naissance : 1932
Adresse : 212 BVD YAKOUB EL MAHSOUR App B HAY SALAM CASABLANCA
Tél. : 05 22 99 24 37 Total des frais engagés : 4806,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 23 / 12 / 2020
Nom et prénom du malade : HOTEK Aicha Age : 1737
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Diabète HTA - coronaropathie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 31 / 12 / 2020

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS

الدكتورة كاريو بلقاضي جويويل

إختصاصية في أمراض الغدد و التغذية

خريجة كلية الطب بباريس

nr NOTIK Azlo

Casablanca, le : 31/12/

579.00

10/5 Toujeo solostar 14 le meti

393.00x5 Janurio 1 le matie

108.65x4 osteo 1 le matie

27.70x4 cardioapril 1 midi

34.00x2 admo rue 1 ce soure le

97.7x5 amep 1 ce

71.00x3 atenor 1 ce

234.00x3 collyre ganfar

120.00x3 13 aiguilles 6 mm + 10 levulles

120.00x3 Low 4 mois

T = 4290.10

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE

119, Bd. BIR ANZARANE

Maârif - CASABLANCA

119, شارع بئر انزران - إقامة رمزي, باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 98 14 67 - 05 22 23 84 84 - 05 22 99 26 53

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA

Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr

Notice : Information de l'utilisateur



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Bimatoprost/timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si la maladie qu'ils souffrent est identique à la vôtre.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé
2. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
3. Comment utiliser GANFORT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml
Collyre en solution - Flacon de 3ml
N° 1800121391
Distribué par les laboratoires AFRIK-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 373 DMP/171/NRO

Notice : Information de l'utilisateur



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Bimatoprost/timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si la maladie qu'ils souffrent est identique à la vôtre.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé
2. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
3. Comment utiliser GANFORT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml
Collyre en solution - Flacon de 3ml
N° 1800121391
Distribué par les laboratoires AFRIK-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 373 DMP/171/NRO

Notice : Information de l'utilisateur



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Bimatoprost/timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si la maladie qu'ils souffrent est identique à la vôtre.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GANFORT et dans quel cas est-il utilisé
2. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
3. Comment utiliser le médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml
Collyre en solution - Flacon de 30ml
N° 1800121391
Distribué par les laboratoires AFRIK-PHAR
PPV : 234DH00
Médicament autorisé N° 373 DMP/171/NRO

أميب 5 ملغ و 10 ملغ
علب من 28 و 56 قرصا
أملوبيبين

AMEP® 5mg
56 comprimés



6 118000 081777

الدواء أثلها تحتوي على معلومات مهمة لك.

من الطبيب أو الصيدلي.

له لشخص آخر حتى في حال وجود أعراض مشابهة. ألك قد تسبب الضرر له
قلت وجود أعراض غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة.

5 ملغ و 10 ملغ القرصا

من مشتقات قنوات الكالسيوم.

بأسم النجحة الصدرية. ومن ضمنها شكل نادر يعرف بذبحة

بأن الأوعية الدموية بحيث يمر الدم من خلالها بصورة أكثر سهولة.
م إلى عضلة القلب. ما كمنه من تلقى للزبد من الأوكسجين. ما
الارتبط بالذبحة الصدرية.

القرصا

العناصر التي يحتوي عليها الدواء والواردة في فقرة "مكونات
له أضرار الجلد أو صعوبات في التنفس.

حالة مرضية لا يقدر القلب فيها أن يوفر ما يكفي من الدم

للجسم.

• إذا كنتم تعانون من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.

أخبروا أثناء استعمال أميب[®] القرصا.

استشعروا طبيبك أو صيدليكم قبل تناول أميب[®] القرصا.

يجب أن تخبروا طبيبك إذا كنتم تعانون أو سبق أن عانيت من الحالات التالية :

- نوبة قلبية مؤخرًا.
- قصور في وظيفة القلب.
- ارتفاع شديد لضغط الدم (أزمة ارتفاع ضغط الدم).
- أمراض الكلى.
- إذا كان سنكم كبيرًا وجرعتكم تحتاج إلى زيادة.

الأطفال والمراهقين

لم تتم دراسة أميب[®] القرصا بالنسبة للأطفال دون 6 سنوات. يجب أن لا يستعمل أميب[®] القرصا إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة (انظر فقرة 3). للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بطبيبكم.

• أدوية أخرى و أميب[®] القرصا:

إذا كنتم تتناولون أو تناولتم مؤخرًا أي أدوية أخرى، ما فيه دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، أخبروا بذلك طبيبك أو صيدليكم.

• الكيتوكونازول (أدوية مضادة للفطريات).

• ديتالين (أدوية مضادة للحساسية) وتسمى مشتقات الأثر البرونشي للستيروئيد لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة).

• الريفامبين (البروفين) (أدوية مضادة حيوية).

• هالوبيريدول (أدوية مضادة للحساسية).

• هيدروكورتيزون (أدوية مضادة للحساسية).

• ديتالين (أدوية مضادة للحساسية).

• النيكوتين (أدوية مضادة للحساسية).

• سيكلوسبورين (دواء مضاد للمناعة).

قد يخفض أميب[®] القرصا ضغط الدم أكثر إذا كنتم تتناولون أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• أميب[®] القرصا مع الأغذية والمشروبات:

يجب الابتعاد عن تناول البقوليات أو عصيره خلال مدة العلاج. لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع تركيز المادة الفعالة أملوبيبين في الدم ما قد يسبب زيادة غير

متوقعة في مفعول الدواء.

استعمال أثناء الحمل والرضاعة :

الحمل:

لم تثبت سلامة استعمال أملوبيبين لدى النساء الحوامل. إذا كنتم تعتمدين ألك حامل أو إذا كنتم تخططين لذلك، يجب إخبار طبيبك قبل تناول

أميب[®].

الرضاعة:

لقد تم إثبات أن أملوبيبين يفرز في حليب الثدي بكميات قليلة. إذا كنتم ترضعين أو إذا كنتم على وشك الإرضاع رضاعة طبيعية، يجب إخبار طبيبك

قبل تناول أميب[®].

إذا كنتم حامل أو ترضعين، إذا كنتم تعتمدين ألك حامل أو تخططين للحمل، استشعروا طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

التأثيرات على القيادة على قيادة السيارات أو استعمال الآلات :

يمكن أن يؤثر أميب[®] القرصا على قدرتك على سيطرة السيارات واستعمال الآلات. إذا نتج عن تناول القرصا غثاس، دوخة أو صداع فجب

عدم سيطرة السيارات وعدم استعمال الآلات. وينبغي الاتصال بطبيبكم فورًا.

• إشارات إلى الصفات معروفة التأثير:

غير وازر.

3. كيفية تناول أميب[®] القرصا:

احتموا دائما الجرعة التي يصفها طبيبك. وفي حالة الشك، استشعروا طبيبك أو صيدليكم.

الجرعة الأولية للعانة من أميب[®] هي 5 ملغ مرة واحدة في اليوم. ويمكن زيادة هذه الجرعة إلى 10 ملغ مرة في اليوم.

يمكن تناول الدواء قبل أو بعد استهلاك الأغذية والمشروبات. ومن الأفضل تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم مع كوب من الماء.

لا تتناولوا أميب[®] مع عصير الليمون.

كيفية الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين

بالنسبة للأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة)، الجرعة الأولى للعانة للموصى بها هي 2.5 ملغ يوميا. والجرعة القصوى الموصى

بها هي 5 ملغ يوميا. أميب[®] القرصا 2.5 ملغ غير متوفرة حاليا.

من المهم الاستمرار في تناول القرصا. لا تلتفتوا حتى تكملوا تناول كافة القرصا قبل استشارة طبيبك.

إذا أعظم كمية من أميب[®] أكثر ما ينبغي :

إن تناول الكثير من القرصا يمكن أن يتسبب أضرارا في انخفاض خطر لضغط الدم. ويمكن أن تشعروا

بالوهن. إذا انخفض ضغط الدم بطريقة حادة جدا، يمكن أن تحدث سدمة. قد تصبح بشرتكم باردة ودية ويمكن

إذا تناولتم القرصا كثيرا من أميب[®] القرصا.

أميب 5 ملغ و 10 ملغ
علب من 28 و 56 قرصا
أملوبيبين

AMEP® 5mg

56 comprimés



6 118000 081777

الدواء أثارها تحتوي على معلومات مهمة لك.

من الطبيب أو الصيدلي.

له لشخص آخر حتى في حال وجود أعراض مشابهة. أياك قد تسبب الضرر له
قلت وجود أعراض غير مرغوب فيه غير منصوص في هذه النشرة.

5 ملغ و 10 ملغ القرصا

من مشتقات قنوات الكالسيوم.

بأسم النبتة الصخرية. ومن ضمنها شكل نادر يعرف بنبتة

بماء الأوعية الدموية بحيث يمر الدم من خلالها بصورة أكثر سهولة.
م إلى عضلة القلب. ما يمكنه من تلقي المزيد من الأوكسجين. ما
الارتبط بالنبتة الصخرية.

القرصا

العناصر التي يحتوي عليها الدواء والواردة في فقرة "مكونات
له أضرار الجلد أو صعوبات في التنفس.

حالة مرضية لا يقدر القلب فيها أن يوفر ما يكفي من الدم

للجسم.

• إذا كنتم تعانون من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.

أخبروا أثناء استعمال أميب القرصا.

استشعروا طبيبك أو صيدليكم قبل تناول أميب القرصا.

يجب أن تخبروا طبيبك إذا كنتم تعانون أو سبق أن عانيت من الحالات التالية :

- نوبة قلبية مؤخرًا
- قصور في وظيفة القلب
- ارتفاع شديد لضغط الدم (أزمة ارتفاع ضغط الدم)
- أمراض الكلى
- إذا كان سنكم كبيرًا وجرعتكم تحتاج إلى زيادة.

الأطفال والمراهقين

لم تتم دراسة أميب القرصا بالنسبة للأطفال دون 6 سنوات. يجب أن لا يستعمل أميب القرصا إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة (انظر فقرة 3). للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بطبيبكم.

• أدوية أخرى و أميب القرصا:

إذا كنتم تتناولون أو تناولتم مؤخرًا أي أدوية أخرى، ما فيه دواء تم الحصول عليه دون وصفة طبية، أخبروا بذلك طبيبك أو صيدليكم.

• الكيتوكونازول (أدوية مضادة للفطريات)

• ديتالين (أدوية مضادة للغثاس) وتسمى مشتقات الأثر البرونشي

• الريفامبين (أدوية مضادة للعدوى)

• هالوبيريدول (أدوية مضادة للذهان)

• هيدروكورتيزون (أدوية الالتهاب)

• ديتالين (أدوية مضادة للالتهاب)

• النيكوتين (أدوية مضادة للتدخين) والنيكوتين (أدوية مضادة للتدخين)

• سيكلوسبورين (أدوية مضادة للعدوى)

قد يخفض أميب القرصا ضغط الدم أكثر إذا كنتم تتناولون أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• أميب القرصا مع الأغذية والمشروبات:

يجب الابتعاد عن تناول البقوليات أو عصيره خلال مدة العلاج. لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع تركيز المادة الفعالة أملوبيبين في الدم ما قد يسبب زيادة غير

متوقعة في مفعول الدواء.

استعمال أثناء الحمل والرضاعة :

الحمل:

لم تثبت سلامة استعمال أملوبيبين لدى النساء الحوامل. إذا كنتم تعتمدين ذلك حامل أو إذا كنتم تخططين لذلك، يجب إخبار طبيبك قبل تناول

أميب القرصا.

الرضاعة:

لقد تم إثبات أن أملوبيبين يفرز في حليب الثدي بكميات قليلة. إذا كنتم ترضعين أو إذا كنتم على وشك الإرضاع رضاعة طبيعية، يجب إخبار طبيبك قبل تناول

أميب القرصا.

إذا كنتم حامل أو ترضعين، إذا كنتم تعتمدين ذلك حامل أو تخططين للحمل، استشعروا طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

التأثيرات على القيادة على قيادة السيارات أو استعمال الآلات :

يمكن أن يؤثر أميب القرصا على قدرتك على سيطرة السيارات واستعمال الآلات. إذا نتج عن تناول القرصا غثاس، دوخة أو صداع فاجب عدم سيطرة السيارات وعدم استعمال الآلات. وينبغي الاتصال بطبيبكم فورًا.

• إشارات إلى الصفات معروفة التأثير:

غير وازر.

3. كيفية تناول أميب القرصا

احتموا دائما الجرعة التي يصفها طبيبك. وفي حالة الشك، استشعروا طبيبك أو صيدليكم.

الجرعة الأولية للعدوى من أميب 5 ملغ مرة واحدة في اليوم. ويمكن زيادة هذه الجرعة إلى 10 ملغ مرة في اليوم.

يمكن تناول الدواء قبل أو بعد استهلاك الأغذية والمشروبات. ومن الأفضل تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم مع كوب من الماء.

لا تتناولوا أميب مع عصير البوملوس.

كيفية الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين

بالنسبة للأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة)، الجرعة الأولى للعدوى للموسى بها هي 2.5 ملغ يوميا. والجرعة القصوى للموسى

بها هي 5 ملغ يوميا. أميب القرصا 2.5 ملغ غير متوفرة حاليا.

من المهم الاستمرار في تناول القرصا. لا تلتفتوا حتى تكملوا تناول كافة القرصا قبل استشارة طبيبك.

إذا أعظم كمية من أميب أكثر ما ينبغي :

إن تناول الكثير من القرصا يمكن أن يتسبب أضرارا في انخفاض خطر لضغط الدم. ويمكن أن تشعروا بفتور الدمعي أو أن تشعروا

بالوهن. إذا انخفض ضغط الدم بطريقة حادة جدا، يمكن أن تحدث سدمة. قد تصبح بشرتكم باردة ودمية ويمكن أن تتناولتم القرصا كثيرا من أميب القرصا.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement ce prospectus.
2. Gardez cette notice.
3. Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.
4. Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical.
5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, consultez votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique aux médicaments mentionnés dans ce prospectus.

ATENOR® 100 mg

56 comprimés



Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles

Comp

3. Con

4. Qu

5. Con

6. Inf

1. QU

EST-IL

Class

Indica

Ce m

effets beta) du système sympathique de régulation card

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants:

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et étendues (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques formes sévères (troubles circulatoires symétriques avec engourdissements et troubles artériels périphériques graves),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande rénale sécrétant des substances provoquant une hypertension sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement ce prospectus.
2. Gardez cette notice.
3. Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.
4. Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical.
5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, consultez votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique aux médicaments mentionnés dans ce prospectus.

ATENOR® 100 mg

56 comprimés



Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles

Comp

3. Con

4. Qu

5. Con

6. Inf

1. QU

EST-IL

Class

Indica

Ce m

effets beta) du système sympathique de régulation card

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants:

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et évolutives (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques formes sévères (troubles circulatoires symétriques avec engourdissements et troubles artériels périphériques graves),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande rénale sécrétant des substances provoquant une hypertension sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement le prospectus qui accompagne ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.
2. Gardez cette notice.
3. Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.
4. Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical. Il ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres médicaments.
5. Si vous ressentez des effets secondaires, consultez votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique à tous les médicaments.

ATENOR® 100 mg

56 comprimés



Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles

Comp

3. Con

4. Qu

5. Con

6. Inf

1. QU

EST-IL

Class

Indica

Ce m

effets beta) du système sympathique de régulation card

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants:

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et évolutives (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques formes sévères (troubles circulatoires symétriques avec engourdissements et troubles artériels périphériques des extrémités sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande rénale sécrétant des substances provoquant une hypertension sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

diminuent le taux de sucre dans le sang et que vous pouvez

Notice : information du patient

FR

Januvia® 100 mg, comprimés pelliculés Sitagliptine

**Veillez lire attentivement cette notice avant
de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement p
Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pour
être nocif, même si les signes de leur maladie s
identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

hypoglycémiant ou à l'insuline, vous pouvez avoir un faible
taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin
peut diminuer la posologie du sulfamide hypoglycémiant
ou de l'insuline.

Enfants et adolescents

Les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans ne doivent
pas utiliser ce médicament. L'efficacité et la sécurité d'emploi
de ce médicament n'ont pas été démontrées chez les enfants
et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Januvia

ou votre pharmacien si vous prenez,
pourriez prendre tout autre

si vous prenez notamment de la
utilisé pour traiter les battements
autres problèmes cardiaques).

être nécessaire en cas d'association avec Januvia.
niveau des taux de digoxine dans votre sang peut

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil



JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

diminuent le taux de sucre dans le sang et que vous pouvez

Notice : information du patient

FR

Januvia® 100 mg, comprimés pelliculés Sitagliptine

**Veillez lire attentivement cette notice avant
de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement p
Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pour
être nocif, même si les signes de leur maladie s
identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

hypoglycémiant ou à l'insuline, vous pouvez avoir un faible
taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin
peut diminuer la posologie du sulfamide hypoglycémiant
ou de l'insuline.

Enfants et adolescents

Les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans ne doivent
pas utiliser ce médicament. L'efficacité et la sécurité d'emploi
de ce médicament n'ont pas été démontrées chez les enfants
et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Januvia

ou votre pharmacien si vous prenez,
pourriez prendre tout autre

si vous prenez notamment de la
utilisé pour traiter les battements
autres problèmes cardiaques).

être nécessaire en cas d'association avec Januvia.
niveau des taux de digoxine dans votre sang peut

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil



JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

diminuent le taux de sucre dans le sang et que vous pouvez

Notice : information du patient

FR

Januvia® 100 mg, comprimés pelliculés Sitagliptine

**Veillez lire attentivement cette notice avant
de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement p
Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pour
être nocif, même si les signes de leur maladie s
identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

hypoglycémiant ou à l'insuline, vous pouvez avoir un faible
taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin
peut diminuer la posologie du sulfamide hypoglycémiant
ou de l'insuline.

Enfants et adolescents

Les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans ne doivent
pas utiliser ce médicament. L'efficacité et la sécurité d'emploi
de ce médicament n'ont pas été démontrées chez les enfants
et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Januvia

ou votre pharmacien si vous prenez,
pourriez prendre tout autre

si vous prenez notamment de la
utilisé pour traiter les battements
autres problèmes cardiaques).

être nécessaire en cas d'association avec Januvia.
niveau des taux de digoxine dans votre sang peut

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil



JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

diminuent le taux de sucre dans le sang et que vous pouvez

Notice : information du patient

FR

Januvia® 100 mg, comprimés pelliculés Sitagliptine

**Veillez lire attentivement cette notice avant
de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement p
Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pour
être nocif, même si les signes de leur maladie s
identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

hypoglycémiant ou à l'insuline, vous pouvez avoir un faible
taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin
peut diminuer la posologie du sulfamide hypoglycémiant
ou de l'insuline.

Enfants et adolescents

Les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans ne doivent
pas utiliser ce médicament. L'efficacité et la sécurité d'emploi
de ce médicament n'ont pas été démontrées chez les enfants
et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Januvia

ou votre pharmacien si vous prenez,
pourriez prendre tout autre

si vous prenez notamment de la
utilisé pour traiter les battements
autres problèmes cardiaques).

être nécessaire en cas d'association avec Januvia.
niveau des taux de digoxine dans votre sang peut

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil



JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

diminuent le taux de sucre dans le sang et que vous pouvez

Notice : information du patient

FR

Januvia® 100 mg, comprimés pelliculés Sitagliptine

**Veillez lire attentivement cette notice avant
de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre
pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement p
Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pour
être nocif, même si les signes de leur maladie s
identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir

hypoglycémiant ou à l'insuline, vous pouvez avoir un faible
taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Votre médecin
peut diminuer la posologie du sulfamide hypoglycémiant
ou de l'insuline.

Enfants et adolescents

Les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans ne doivent
pas utiliser ce médicament. L'efficacité et la sécurité d'emploi
de ce médicament n'ont pas été démontrées chez les enfants
et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Januvia

ou votre pharmacien si vous prenez,
pourriez prendre tout autre

si vous prenez notamment de la
utilisé pour traiter les battements
autres problèmes cardiaques).

être nécessaire en cas d'association avec Januvia.
niveau des taux de digoxine dans votre sang peut

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez
être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil



JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

النشرة: معلومات للمستخدم

توجيو®

300 وحدة/ملل

محلول للحقن في قلم واخر معبأ مسبقاً
أنسولين غلارجين

اقرأ بتمعن كامل هذه النشرة قبل استعمال هذا
الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
- إن كان لديك أسئلة أخرى. إسأل طبيبك أو الصيدلاني
أو الممرض(ة).

- هذا الدواء وصف خصيصاً لك. لا
غيرك. يمكن أن يؤذيهم حتى ولو ك
مائلة لأعراضك.

- في حال أحسست بأي تأثير غير مرغو
طبيبك أو الصيدلاني بذلك. ذلك ينطب
تأثير غير مرغوب فيه لم يتم ذكره في هذه النشرة. أنظر
البند 4.

سافر
Sandoz-aventis Maroc
Route de Rabat-R.P.1,
Ain sebaa Casablanca
TOLLJEO 300
solo b3 st
P.F.V : 579,00 DH



ل أن تسافر استشر طبيبك للاستعلام عن النقاط الت
قر الأنسولين في البلد الذي سوف تسافر اليه.
يود بالأنسولين وبالحاقن. ألخ.
طريقة الحفظ الملائمة للأنسولين خلال السفر.
• مواعيد الطعام وحقن الأنسولين.
• التأثيرات الممكنة لتغير المنطقة الزمنية.
• المخاطر المحتملة على صحتك في البلد الذي

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pour.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.
- Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.
18001090280
- Consultez votre médecin ou à votre pharmacien, mais à quelqu'un d'autre, même si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez-les à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourriez en avoir besoin, mais à quelqu'un d'autre, même si l'un des effets indésirables devient grave, ne mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez-les à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourriez en avoir besoin, mais à quelqu'un d'autre, même si l'un des effets indésirables devient grave, ne mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez-les à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourriez en avoir besoin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, mentionnez-le dans cette notice, parlez-en à votre médecin, mais à quelqu'un d'autre, même si vous ne trouvez pas de pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professor Emerita,
University of London
(1920-2010)
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Osteocare 30 CP
PVC : 108.65 DH
Lot : 245629A
Utl Av : 30/06/2024
lphabiotics

osteoare es une marque déposée.
ur votre santé

Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholécalciférol, (Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose!)

Merci d'avoir ch

A propos de VitaBiotics
VitaBiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaire. Chaque produit VitaBiotics par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme naturel. VitaBiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations et réponses aux questions fréquemment posées.

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace 3 & Glucosamine Capsules
- Jointace Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Vitamine C
- Jointace Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine
- Jointace Effervescent au goût agréable
- Jointace Patch avec de l'extrait de Gingembre & huiles essentielles.
- Jointace 3 & Glucosamine



Avancée nutritionnelle que pour les hommes

Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétiques plus importante.
- Idéal en association avec Wellman original.

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professor Emerita,
University of London
(1920-2010)
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Osteocare 30 CP
PVC : 108.65 DH
Lot : 245629A
Utl Av : 30/06/2024
Iphabiotics

osteoare es une marque déposée.

Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholestécalciférol, (Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose!)

Merci d'avoir ch

Visitez notre site

Nous réfléchissons à

La gamme de perfection pour la

santé des articulations



Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

Jointace 3 & Glucosamine Capsules

Jointace Patch avec de l'extrait de Gingembre & huiles essentielles.

Jointace Effervescent à gout agréable.

Jointace Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.

Jointace Patch avec de l'extrait de Gingembre & huiles aromathérapeutiques.



Avancée nutritionnelle que pour les hommes

Wellman

- Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.
- Wellman Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Wellman Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétiques plus importante.
- Idéal en association avec Wellman original.

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professor Emerita,
University of London
(1920-2010)
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Osteocare 30 CP
PVC : 108.65 DH
Lot : 245629A
Utl Av : 30/06/2024
Iphabiotics

osteoare es une marque déposée.

Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholestécalciférol, (Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose!)

Merci d'avoir ch

A propos de VitaBiotics
VitaBiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaire. Chaque produit VitaBiotics par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme naturel. VitaBiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations aux questions fréquemment posées.

Wellman®



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec Stallone avec l'extrait de Cardoace.

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® 3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Patch avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Alginate Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & MSM.
- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Chondroïtine & Huiles aromathérapeutiques.

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professor Emeritus
University of London
(1920-2010)
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Osteocare 30 CP
PVC : 108.65 DH
Lot : 245629A
Utl Av : 30/06/2024
Iphabiotics

osteoCare est une marque déposée.

Wellman



- Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.
- Wellman Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec Stallone avec l'extrait de Cardoace.

Jointace



- Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:
- Jointace 3 & Glucosamine Capsules
- Jointace 3 & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Chondroline & MSM
- Jointace Effervescent à gout agréable.
- Jointace Gel avec de l'extrait de Gingembre & huiles essentielles.
- Jointace Patch avec Glucosamine, Chondroline & huiles aromathérapeutiques.

Merci d'avoir ch
A propos de VitaBiotics
VitaBiotics est une société britannique d'expérience et leader dans l'innovation alimentaire. Chaque produit VitaBiotics par des experts pour aider efficacement à assurer son propre métabolisme naturel. VitaBiotics.com offre une gamme complète de fonctionnalités y compris des informations et réponses aux questions fréquemment posées.

Ingrédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrants: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholestécalciférol, (Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose!)



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.
 Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماسی در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
 #14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
 Vali-e-Asr Ave.,
 Tehran, 1967865637
 Iran
 Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
 7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
 NIGERIA
 TELEPHONE: +2348033131500
 Email: ahs@abiagait.com
 Website: www.abiagait.com
 NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
 Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

**Contour™
 plus**

کونتور پلاس / کنتور پلاس



25

Test Strips
 Bandelettes
 réactives

شریط اختبار
 نوار تست

For use with / À utiliser avec
 لاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
 دستگاههای تست قند خون

**CONTOUR™
 PLUS**

Meters / lecteurs
 کونتور پلاس / کنتور پلاس

REF 84627446

**Contour™
 plus**

کونتور پلاس / کنتور پلاس

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

25

Test Strips
 Bandelettes
 réactives

شریط اختبار
 نوار تست

**NO
 CODING**
 SANS CODAGE



CONTROL N 108-141 mg/dL

CONTROL L 36-47 mg/dL

CONTROL H 318-414 mg/dL

LOT DP9HQHC31A

2019-08

2021-08

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS

الدكتورة كاريو بلقاضي جوويل

إختصاصية في أمراض الغدد و التغذية

خريجة كلية الطب بباريس

Casablanca, le :

23.12.2020

gms 21011 K Aiche

, HBsAg
NFS



Dr. CARIOU - BELQADI Joëlle
B. BELQADI
119, Bd. BIR ANZARANE
Maarif - CASABLANCA

1200579

119, شارع بئر انزران - إقامة رمزي, باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 98 14 67 - 05 22 23 84 84 - 05 22 99 26 53

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maarif - 20100 CASABLANCA

Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Dr. Abderrazzak ZIZI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Reims



Casablanca le : 23-12-2020

Mme MOTIK Aicha

Code : 16050955

Référence : A201200571

Du : 23-12-2020

Prescripteur : Dr CARIOU BELQADI JOELLE

Normes

Antériorités

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

Numération Globulaire

				05-03-2019
Hématies	5.1	M/mm ³	(4.0-5.3)	4.2
Hémoglobine	13.8	g/dL	(12.5-15.5)	10.8
Hématocrite	39	%	(37-46)	31
VGM	76	μ ³	(80-95)	74
TCMH	27	pg	(28-32)	26
CCMH	35	g/100mL	(30-35)	35

Formule leucocytaire

Leucocytes		9 780	/mm ³	(4 000-10 000)	9 940
Neutrophiles	70 % soit	6 846	/mm ³	(1 500-7 500)	7157
Eosinophiles	1 % soit	98	/mm ³	(<400)	99
Basophiles	0 % soit	0	/mm ³	(<100)	0
Lymphocytes	23 % soit	2 249	/mm ³	(1 500-4 000)	1193
Monocytes	6 % soit	587	/mm ³	(200-1 000)	1491

Numération plaquettaire

Plaquettes	232 000	/mm ³	(150 000-400 000)	286 000
Volume Plaquettaire Moyen	10.6	fL	(6.0-11.0)	9.7



مختبر التحاليل الطبية المعاريف
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Casablanca le : 23-12-2020

Mme MOTIK Aicha

Code : 16050955

Référence : A201200571

Normes

Antécédents

BIOCHIMIE SANGUINE

Hémoglobine glyquée (HBA1c)
(Technique HPLC)

8.6 %


(<6.5)

20-07-2020

8.8

Commentaire

Mise en évidence d'un variant de l'hémoglobine présumé de type C.
Il est conseillé d'effectuer une électrophorèse de l'hémoglobine et de
surveiller le diabète par le dosage de la fructosamine.



مختبر التحاليل الطبية المعاريف
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF



Laboratoire Certifié ISO 9001 du 06/04/15

Dr. Abderrazzak ZIZI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Reims



Casablanca le 23-12-2020

Mme MOTIK Aicha

FACTURE N° A201200571

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Traitement échantillon sanguin	E25	E
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0216	Numération formule	B80	B

Total des B : 180

TOTAL DOSSIER : 266.20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
deux cent soixante-six dirhams vingt centimes

