

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVRER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0750 Société : 54553

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MR IBRAHIMI Mohamed

Date de naissance :

Adresse : 47 Rue Sidi El HASSAN Alouït CASA
Gauthier

Tél. : 066 124 1342 Total des frais engagés : 539 DH
0522 29 7467

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. ZEMMAMA O. SPF
45, Bd. Bk Anzaramo
C 05 22 25 03 730
GSM : 06 61 14 99 06
Fax : 05 22 25 13 00
Email : zol2@live.fr

11 JAN. 2021

ACCUEIL

Date de consultation : 12 DEC 2020

Nom et prénom du malade : Dr. IBRAHIMI Mohamed Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

DSS Bz resp

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MUSA

Le : 6/1/2021

Signature de l'adhérent(e) fla7

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 DEC 2020	U		15900	Dr. ZBAMMAMA O. LOI 45, Bd. Bir Anzerane C : 06 22 25 03 73 GSM : 06 61 14 99 86 Fax : 05 22 25 13 00 mail: zol2@live.fr

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Montant de la Facture

189,02

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

**Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue**

Date

Évaluation et désignation des coefficients

**Montant
des Honoraires**

es Honoraire

AUXILIAIRES MEDICAUX

**Cachet et signature
du Praticien**

Date des

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM	PC	IM	IV	Méthode de calcul des Honoraires
			
			
			
			
			

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature de la

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES		DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram shows the human mandible (lower jawbone) in an occlusal view. The teeth are numbered 1 through 8 on both the upper and lower arches. Numbered arrows point in various directions: a vertical arrow labeled 'H' points upwards from the 1s; a horizontal arrow labeled 'D' points to the left from the 8s; a horizontal arrow labeled 'G' points to the right from the 8s; and a vertical arrow labeled 'B' points downwards from the 1s.

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE SERVICE

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Casablanca, Le 12 DEL 2020

الدار البيضاء في

M. IBRAHIMI Mohamed

1°) 472 ml 90,50
e cp / sci op derri

2°) Cotipred 20 48,10
3,5 cp di Luis Lillati eu lpu

3°) Dufl saes saue 2 x 25,00
e cas 3x5

T = 189 س

صيدلية الروdanى
PHARMACIE ROUDANI
Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef
Marrakech - Casablanca
Tél. : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

Dr ZEMMAMA O LOTFI
45 Bd Bir Anzarane
C 05 22 25 03 73
GSM 06 61 14 99 86
FAX 05 22 25 13 00
zol2@live.fr

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
TEL : 05 22 25 03 73
Fax : 05 22 25 13 00
GSM : 06 61 14 99 86
E-mail : zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE

45, شارع بير أنزاران الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 25 03 73
الفاكس : 05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
البريد الإلكتروني : zol2@live.fr



Casablanca, Le

18 DEC. 2020

الدار البيضاء في

Toux persistante

Dx + Pulin

Dr. ZEMMAMA O. LOTFI
45, Bd. Bir Anzarane
C : 06 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 05 22 25 13 00
Email : zol2@live.fr

12/02/2020 04:57
Casablanca
2/ Dr. Zemmama O. Lotfi
Zemmama O. Lotfi
Zemmama O. Lotfi

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
TEL : 05 22 25 03 73
Fax : 05 22 25 13 00
GSM : 06 61 14 99 86
E-mail : zol2@live.fr

45، شارع بئر أنزاران الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 25 03 73
الفاكس : 05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
البريد الإلكتروني : zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Dichlorhydrate
de Lévocétirizine
5 mg, comprimé pelliculé

- La substance active est : dichlorhydrate de lévocétirizine 5 mg pour un comprimé pelliculé

- Les autres composants sont :

Comprimé nu : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage : Opadry Y-1-7000 [hypromellose (E 464), dioxyde de titane (E 171), macrogol 400]

1. QU'EST- CE QUE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé, boîte de 14 et 28. XYZALL est un médicament anti-allergique indiqué dans le traitement des symptômes associés à l'allergie, tels que :

- La rhinite allergique saisonnière (rhume des foins), y compris les atteintes oculaires (conjonctivite allergique) ;
- La rhinite allergique chronique ;
- L'urticaire.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

XYZALL 5mg, comprimé pelliculé, NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la lévocétirizine ou à toute substance chimique apparentée, ou à l'un des autres composants contenus dans XYZALL.
- Si vous souffrez d'insuffisance rénale grave.

Prendre des précautions particulières avec XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé

Mises en garde :

- XYZALL n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 6 ans.
- XYZALL ne doit pas être utilisé en cas de galactose, de déficit en lactose (maladies métaboliques) ou de troubles rénaux.

LOT 201410 2

dosage adapté,
glucose et du
lactose dans

EXP 06 2024

autre maladie.

Précautions d'emploi :

- Si vous souffrez de troubles rénaux, la dose pourra être adaptée.
- Suivez les instructions de votre médecin.
- La prudence est recommandée en cas d'absorption accidentelle chez certains patients sensibles, la prise simultanée de lévocétirizine et d'alcool peut entraîner des effets indésirables sur le système nerveux, bien que la cétrizine (produit chimiquement apparenté) n'ait jamais montré une augmentation des effets liés à l'alcool.

PPV 90 50

chez certains
sur le système

Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

D'une façon générale, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Cotipred® 20 mg

Prednisolone

COMPOSITION :

Prednisolone (Sous forme métasulfobenzoate sodique) exprimé en base 20 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé.
Excipients à effet notoire : lactose, sorbitol (contenu dans l'arôme orange-pamplemousse)

PRESENTATION :

Boîte de 20 comprimés solubles effervescents avec barre de cassure.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- la plupart des infections, - certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona), - certains troubles mentaux non traités, - vaccination par des vaccins vivants, - allergie à l'un des constituants.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions)

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladie du côlon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison de maladies parasitaires.

PENDANT LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de la teneur en sodium.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRE

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS, FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN et notamment les troubles du rythme cardiaque : astémizole, bêpridil, erythromycine et injection intra-veineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, vincamine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

GROSSESSE : Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

ALLAITEMENT : L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait maternel.

MEDECIN OU DE
PPV : 48DH50
PER : 04-23
LOT : J1306

MEDICAMENTS IL
TOURS A VOTRE
nt donner certains

DRILL TOUX SECHE 15 mg/5ml ADULTES SANS SUCRE

(DCI : Bromhydrate de dextrométhorphan)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST CE QUE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5ml ADULTES SANS SUCRE ? ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15mg/5ml ADULTES SANS SUCRE ?
- COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTEUILS ?
- COMMENT CONSERVEZ DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ? ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTITUSSIF

(R : système respiratoire)

Indications thérapeutiques

Traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation chez l'adulte (à partir de 15 ans)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

Vous ne devez pas prendre ce médicament si :

- Vous êtes allergique à l'un des constituants,
- Vous êtes asthmatique,
- Vous êtes insuffisant respiratoire,
- Vous êtes traité par les IMAO (médicaments prescrits au cours de certains états dépressifs),
- Vous allaitez.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Faites attention avec DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

Mises en garde spéciales

- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensables.
- Ne traitez pas par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux de défense nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchique.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, prenez l'avis de votre médecin.

- Ce médicament contient du maltitol liquide. Son utilisation est déconseillée aux patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions a

Attention ! Ce médicament contient de l'alcool : le titre alcoolique du sirop est de 1.3% soit 0,05 g d'alcool par mesure de 5 ml.

Ce médicament contient 1.3% V/V d'éthanol (alcool) c'est-à-dire jusqu'à 0,05g d'alcool par mesure de 5 ml. L'utilisation de ce médicament est dangereuse pour les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

N'utilisez ce médicament qu'avec précaution

- En raison de la présence d'alcool, un avis médical est nécessaire avant la prise de ce médicament en cas de maladie du foie ou d'épilepsie.

• En cas de survenue de fièvre, comme d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas a préconisé, ne pas prendre conjointement u VOTRE MEDECIN.

• N'utilisez pas un médicament fluidifiant mucolytique) avec cet antitussif.

Interactions avec d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS, notamment au cours de certains états dépressifs), SIGNALER A VOTRE MEDECIN TOUT TRAITEMENT EN COURS

Ce médicament contient un antitussif le déconfinement ou confinement, un autre antitussif dépasser les doses maximales conseillées.

Interactions avec les aliments et les boissons La consommation de boissons alcoolisées peut détruire l'effet du médicament de traitement.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez Ne prenez pas de médicament sans avoir consulté votre pharmacien

Grossesse

Il est possible de prendre un médicament dans le cours de la grossesse, à condition que cela soit dans les doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise de certains médicaments peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né.

Il convient de toujours demander l'avis de votre pharmacien avant de prendre un médicament contenant du dextrométhorphan.

En raison de la présence d'alcool, ce médicament ne doit pas être pris par les femmes enceintes.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. De trop fortes doses de dextrométhorphan peuvent entraîner des pauses respiratoires chez l'enfant et entraîner une mort subite en conséquence, la prise de ce médicament est déconseillée.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

Ce médicament provoque parfois une somnolence et des vertiges risquant d'être dangereux chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de certaines machines. Cela peut entraîner des réactions imprévues. Il peut être utile de commencer le traitement par petites doses.

Ce phénomène est accentué par la prise d'alcool.

Liste des excipients à effet notable

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) ;

Parahydroxybenzoate de propyle (E216) ;

Alcool ;

Maltitol liquide.

3. COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

N'utilisez pas ce médicament

Posologie

RESERVE A LA PHARMACIE

PPV (DH) :

LOT N° :

95/00

UT. AV. :

Fréquence d'administration

Espacez les prises d'au moins 4 heures.

Ce médicament n'est à prendre qu'aux horaires indiqués. Si une prise est manquée, prenez la prochaine à l'heure habituelle. Ne prenez pas deux doses en même temps.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est de 10 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de DRILL TOUX SECHE, que vous n'auriez pas dû :

En cas de surdosage aigu, les symptômes peuvent être :

DRILL TOUX SECHE 15 mg/5ml ADULTES SANS SUCRE

(DCI : Bromhydrate de dextrométhorphan)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Garder cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST CE QUE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5ml ADULTES SANS SUCRE ? ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15mg/5ml ADULTES SANS SUCRE ?
- COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTEUILS ?
- COMMENT CONSERVEZ DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ? ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTITUSSIF

(R : système respiratoire)

Indications thérapeutiques

Traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation chez l'adulte (à partir de 15 ans)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

Vous ne devez pas prendre ce médicament si :

- Vous êtes allergique à l'un des constituants,
- Vous êtes asthmatique,
- Vous êtes insuffisant respiratoire,
- Vous êtes traité par les IMAO (médicaments prescrits au cours de certains états dépressifs),
- Vous allaitez.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Faites attention avec DRILL TOUX SECHE 15mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

Mises en garde spéciales

- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensables.
- Ne traitez pas par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux de défense nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchique.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, prenez l'avis de votre médecin.

- Ce médicament contient du maltitol liquide. Son utilisation est déconseillée aux patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions a

Attention ! Ce médicament contient de l'alcool : le titre alcoolique du sirop est de 1.3% soit 0,05 g d'alcool par mesure de 5 ml.

Ce médicament contient 1.3% V/V d'éthanol (alcool) c'est-à-dire jusqu'à 0,05g d'alcool par mesure de 5 ml. L'utilisation de ce médicament est dangereuse pour les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

N'utilisez ce médicament qu'avec précaution

- En raison de la présence d'alcool, un avis médical est nécessaire avant la prise de ce médicament en cas de maladie du foie ou d'épilepsie.

• En cas de survenue de fièvre, comme d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas a préconisé, ne pas prendre conjointement u VOTRE MEDECIN.

• N'utilisez pas un médicament fluidifiant mucolytique) avec cet antitussif.

Interactions avec d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS, notamment au cours de certains états dépressifs), SIGNALER A VOTRE MEDECIN TOUT TRAITEMENT EN COURS

Ce médicament contient un antitussif le déconfinement ou confinement, un autre antitussif dépasser les doses maximales conseillées.

Interactions avec les aliments et les boissons La consommation de boissons alcoolisées peut détruire l'effet du médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez Ne prenez pas de médicament sans avoir consulté votre pharmacien.

Grossesse

Il est possible de prendre un médicament dans le cours de la grossesse, à condition que cela soit dans les doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise d'antitussifs peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né.

Il convient de toujours demander l'avis de votre pharmacien avant de prendre ce médicament contenant du dextrométhorphan.

En raison de la présence d'alcool, ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. De trop fortes doses de dextrométhorphan peuvent entraîner des pauses respiratoires chez le nouveau-né.

En raison de la présence d'alcool, ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules

Ce médicament provoque parfois une somnolence et des vertiges risquant d'être dangereux chez les conducteurs et les utilisateurs de certaines machines. Cela peut entraîner des réactions imprévues. Il peut être utile de commencer le traitement par petites doses.

Ce phénomène est accentué par la prise d'alcool.

Liste des excipients à effet notable

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) ;

Parahydroxybenzoate de propyle (E216) ;

Alcool ;

Maltitol liquide.

3. COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE

N'utilisez pas ce médicament

Posologie

RESERVE A LA PHARMACIE

PPV (DH) :

LOT N° :

95/00

UT. AV. :

Fréquence d'administration

Espacez les prises d'au moins 4 heures.

Ce médicament n'est à prendre qu'aux horaires indiqués. Si une toux ne survient que le soir, une prise supplémentaire peut être nécessaire.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est de 10 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de DRILL TOUX SECHE, que vous n'auriez pas dû :

En cas de surdosage aigu, les symptômes peuvent être :



Casablanca le 24/12/2020

Dr. Mustapha AKIKI

Spécialiste en Radiologie
Laureat de la Faculté de
Médecine de Nancy
Ex Enseignant à la Faculté de
Médecine

Dr. M. AZ El-Arab BERRADA

Spécialiste en Radiologie
Ex Enseignant à la Faculté de
Médecine

**Dr. Hakima BENKIRANE
Ep. Benjelloun**

Spécialiste en Radiologie
Laureate de la Faculté de
Médecine de Nancy
Ex attachée au CHU Ibnou Rochd
Diplômée de Paris
en Imagerie de la femme

Dr. Imad HANAFI

Spécialiste en Radiologie
Laureat de la Faculté
de Médecine de Bruxelles
Ex. Praticien hospitalier
des hôpitaux de Paris
Radiologie Conventionnelle
et Interventionnelle

**PATIENT : IBRAHIMI MOHAMED
MEDECIN TRAITANT : DR. ZEMMAMA OMAR LOTFI
EXAMEN(S) REALISE(S) : RX. POUMONS DE FACE
M.**

Ascension de la coupole diaphragmatique droite.

Index radio-thoracique normal.

Sinus costo-diaphragmatiques libres

Pas de foyer pleuro-parenchymateux à caractère évolutif évident.

Confraternellement
DR HANAFI
INPE: 091202275

- IRM Haut champ
- Scanner Spiralé Multi-barettes
- Imagerie Cardio-Vasculaire
- Radiologie Générale Numérique
- Mammographie/Tomosynthèse
- Echographie-Doppler Couleur
- Echo-Doppler 3D, 4D
- Echographie Morphologique
- Cone Beam
- Panoramique Dentaire Numérique
- Denta-scanner
- Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie Biphotonique
- Radiologie Interventionnelle



Nom & prénom : IBRAHIMI MOHAMED

FACTURE N° : 20/023094

Date : 24/12/2020

<u>Examen</u>	<u>Montant</u>
RX. POUMONS DE FACE	200,00
Total Montant	
	200,00

27, Rue Ilya Abou Madi - Casablanca
Tél. 0522.20.34.57 / Fax: 0522.47.40.09
E-mail: contact@radiologie-aboumadi.com

Arrêtée la présente Facture à la somme de:

DEUX CENT DIRHAMS

REGLEMENT : ESPECES Le 24/12/2020

Relevé d'identité bancaire
Banque Centrale Populaire
Agence Massira
88, bd massira el khadra Casablanca
Compte n°: 190 780 21211 9307191 000 7 73