

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2335 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KASSE Mohammed

Date de naissance :

Adresse : LOT N° 60 Potissement El FELLAH

Dar Soud 21 douar

Tél. 06 41 93 98 44 Total des frais engagés : 695,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. CARIOU - BELQADJI Soufia
ENDOCRINOLOGUE
115 - 117 - Anzizane
Maârif - CASABLANCA

Date de consultation : 01/01/2011

Nom et prénom du malade : KASSE

Lien de parenté : Lui-même


Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : 

Le : 01/01/2011



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/01/2011	Examen	4	250,00	<i>YOUSRI BOUAROU, BELGADI Josselyne, TEL: 05 22 25 49 25, 119, Bd. Sidi Mazzarane, Casablanca</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DES STADES 2010 50 Rue Al Fourat - Casablanca Tél : 05 22 25 49 25 RÉF : 245509 - File : 35873067 T.F : 40436642	07/01/2011	337,50

ANALYSES - RADIGRAPHIES




Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Signature des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION
				<input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION
				<input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 35533411	D 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	<input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/>
				DATE DU DEVIS
				<input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS



الدكتورة كاريوكادي جووويل

اختصاصية في أمراض الغدد والتغذية

خريجة كلية الطب بباريس

M KAI SOE mal

Casablanca, le : 07/01/2024

1 glucomètre ON CALL sure 
diafarmie 850 1 cp methi 
 $18,00 \times 6 =$ 1 cp bir 
18,00

Rue 3م

337,50 DH

Dr. CARIOU - BELQADI Joëlle
ENDOCRINOLOGUE
119, Bd. Bir Anzarane
Maârif - CASABLANCA

PHARMACIE DES STADES 2010
50, Rue Al Fourat - Casablanca
Tél : 05 22 25 49 25
RC : 245509 - Pte. : 35873067
IF : 40436642

INPE: 092054865

119, شارع بئر انزران - إقامة رمزي، باب (ب) الطابق الثاني - المعارييف - 20100 الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 99 26 53 - 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA
Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr

DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18DH00
PER 06/23
LOT J1719



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18DH00
PER 06/23
LOT J1719



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18 DM 00
PER 06/23
LOT J1719



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18DH00
PER 06/23
LOT J1719



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18DH00
PER 06/23
LOT J1719



DIAFORMINE® 850 mg

METFORMINE

COMPOSITION

Chlorhydrate de metformine 0,00 mg
Excipient : q. s. pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés en boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antidiabétiques oraux - biguanides.

INDICATIONS

Associé à un régime alimentaire ad
traitement du diabète de type 2. Il pe
l'insuline.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Les doses de ce médicament sont dé
résultats d'examens de laboratoire (g/l
à 3 fois par jour.

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler sans les
au petit déjeuner et 1 comprimé au re
Ce médicament doit être pris chaque
médecin.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER

CONTRE-INDICATIONS

DIAFORMINE 850mg, comprimé pelliculé

- hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine,
- en cas de déséquilibre du diabète avec :
- si vous avez une insuffisance rénale majeure (augmentation de la créatinine dans le sang),
- en cas de maladies infectieuses avec fièvre,
- pendant les 2 jours qui suivent une opération importante ou une intervention chirurgicale, ou l'application de produits radiographiques iodés,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une insuffisance hépatique (défaillance du foie),
- en cas de diarrhée persistante, de vomissements répétés,
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées,
- pendant l'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

Au cours du traitement, la survenue de vomissements, de douleurs abdominales accompagnées de crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

Prévenir aussitôt votre médecin sans reprendre votre médicament avant sa visite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination de ce médicament se fait en grande partie par les reins. Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse ou virale: grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire.

La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète et nécessiter un recours transitoire à l'insuline.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour une complication comme une maladie cardiaque, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

PPV 18DH00
PER 06/23
LOT J1719





MEDI BEAUTE

60 Bd BirAnzarane - Maarif

R.C :228521

Patente:35792079

T.V.A :40243110

C.N.S.S:8621212

Tél : 05 22 98 27 06

Le 08/01/2021

FACTURE N°80484

N° ICE : 000022244000036

N° IF:

LAIMOUNA

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
1	ON CALL SURE KIT GLUCOMETRE	150,75	150,75	25,12	20,00
1	ON CALL SURE BAN/50	185,90	185,90	30,98	20,00

TOTAL T.T.C :

336,65

Nbr Articles TVA 7% Base : Montant : TVA 20% Base : Montant 336,65 56,10

*Arrêté la présente facture à la somme de :
Trois Cent Trente Six yh et 65 centimes*