

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W19-597096

55488



Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

03561

Société : RAM

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BERRADI Mostapha

Date de naissance :

01/01/1949

Adresse :

178E Latif Ben Zohbir Rue 17 Oulfa  
Casablanca 20260

Tél. :

0673617765

Total des frais engagés : 0 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

17-12-2020

Nom et prénom du malade :

BERRADI MOSTAPHA

Age : 01/01/2020

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Hyperthyroïdie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca



Le : 04/01/2021

Signature de l'adhérent(e) :

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL MOUSTAKBAL		
JAOUHER YASSIMA	17/12/2020	206.60
Lot Boli 1 - Essaouira	20/12/2020	24,70
07 66 28 78 59 77		
PHARMACIE AL MOUSTAKBAL		
JAOUHER YASSIMA		
Lot Boli 1 - Essaouira		
07 66 28 78 59 77		

ANALYSES - RADIographies			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. A. Akhawayn	17.12.2012	RX THORAX	150 dh

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		AM	PC	IM	IV		

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																				
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																				
<b>SOINS DENTAIRES</b> 		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				INP : <input type="text"/>																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
<b>O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES</b> 		<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td><hr/></td> </tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">I</td> </table>			H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	<hr/>	<hr/>	00000000	00000000	35533411	11433553	<hr/>	<hr/>	B	I
H	G																			
25533412	21433552																			
00000000	00000000																			
<hr/>	<hr/>																			
00000000	00000000																			
35533411	11433553																			
<hr/>	<hr/>																			

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

# مختبر التحاليل الطبية موگادور

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MOGADOR

Dr. MRIOUCH MOSTAFA

Médecin Biologiste spécialisé en :

- Hématologie
- Biochimie
- Bactério-Viro-Parasito-Mycologie
- Immunologie
- Biologie de Reproduction (Diplôme PMA Montpellier)
- Diplôme de Qualité (Bordeaux)
- AUDITEUR IRCA (LONDON)



الدكتور مريوش المصطفى  
طبيب إحيائي متخصص في :

- علم الدم
- علم الكيمياء الإحيائية
- علم الجراثيم ، البفيروسات ، الطفيلييات والفطريات
- علم المناعة
- علم الخصوبة (دبلوم المساعدة على الإنجاب) (مونبولي)
- دبلوم الجودة في الصحة (بوردو)
- دبلوم الجودة IRCA (لندن)

**FACTURE: 42640/2020**

ESSAOUIRA le  
Nom et prénom  
Référence  
Médecin prescripteur

21/12/2020  
**MR BERRADI MOSTAPHA**  
**20L350**

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
NFS. HEMOGRAMME	75
CRP. C- REACTIVE PROTEINE	100
Total du (B)	B 175
Prise de sang (PC)	0,00 DH
Montant en DH	230,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de: **DEUX CENT TRENTÉ DIRHAMS**



Le Système de Management Qualité du  
laboratoire d'analyses médicales **MOGADOR** est certifié



12/12/m

Beradi Mousafer

Farmer

Rx florid (face)

13. حي التال، شارع العقبة - 44000 / BP. 11, PPAL - الوكالة الرئيسية للمياه - الموريتانيا  
Tél : 05 24 47 31 44 / 05 24 78 33 87 - Fax : 05 24 47 25 31 - Email : clinique.akh@gmail.com



20/12/2020

Berardi Mostafa

Clinique Al Akhawayn  
13 quartier des dunes  
13 avenue Al Aqaba - Essaouira  
Tél: 05 24 47 31 44

Fam syn

- NF 5

- C R P

Clinique Al Akhawayn  
13 quartier des dunes  
13 avenue Al Aqaba - Essaouira  
Tél: 05 24 47 31 44

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES  
MOGADOR  
Dr. Mostafa MRIOUCH  
haut. Galaxy 17 Lot Tamanar App. 2  
Essaouira Tél: 05 24 47 65 25

D. Farou



Bera d! flusher a

79,7c

① Azra 50mg

72,00  $\frac{50}{100} \text{ mg/jr} \text{ pdt 3 jw}$



② Addihina



③ Doliprane 1g

40,90  $\frac{1g}{100} \text{ x 4/jr}$



④ Zmecofan



$\frac{1}{2} \text{ j/jr}$

206,60

Dr. HAMID FARESS  
Anesthésiste Réanimateur  
Clinique Al Akhawayn  
13 quartier des dunes, boulevard Al Akaba  
Essaouira - Tel: 05 24 47 31 44

FARESS



# Multivitamines

+Minéraux  
+Oligo-Éléments

## Comprimés effervescents

Complément alimentaire,  
n'est pas un médicament,  
avec des édulcorants.

Sans  
Sucré

72.00 DH

06.2022  
L 2900526



4 026466 004907

ant pour la division cellulaire.

ent entrant dans la composition de plusieurs enzymes et  
ensable à l'ensemble des métabolismes de l'organisme.  
pe à la constitution des os, du cartilage, du tissu  
conjunctif et des dents, augmente la résorption du fer.

Vitamine E Participe à la constitution des membranes cellulaires.

### Minéraux et oligo-éléments:

Calcium Élément important pour la formation de la structure osseuse et pour la fonction musculaire.

Magnésium Participe à la constitution de la substance osseuse et des tendons. Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes qui interviennent dans le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides.

Fer Participe au transport de l'oxygène dans le sang et dans les muscles ainsi qu'au métabolisme énergétique.

Zinc Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes.

Cuivre Élément entrant dans la composition de nombreuses enzymes, soutient la croissance.

Sélénium Favorise le métabolisme cellulaire.

**Composition des vitamines, minéraux et oligo-éléments selon l'exemple Additiva Comprimés effervescents Multivitamines + Minéraux + Oligo-éléments, goût orange, mangue, pêche et mandarine:**

	pour 100 g	par comprimé dissous (4,3 g)	% AJR* par comprimé
Vitamine A	18605 µg RE	800 µg RE	100
Vitamine B1	32,6 mg	1,4 mg	100
Vitamine B2	37,2 mg	1,6 mg	100
Vitamine B6	46,5 mg	2,0 mg	100
Vitamine B12	23,3 µg	1,0 µg	100
Nicotinamide	419 mg NE	18,0 mg NE	100
Acide pantothénique	140 mg	6,0 mg	100
Acide folique	4651 µg	200 µg	100
Biotine	3488 µg	150 µg	100
Vitamine C	1395 mg	60,0 mg	100
Vitamine E	69,8 mg α-TE	3,0 mg α-TE	30
Calcium	2791 mg	120 mg	15
Magnésium	1047 mg	45,0 mg	15
Fer	48,8 mg	2,1 mg	15
Zinc	105 mg	4,5 mg	30
Cuivre	11628 µg	500 µg	—
Sélénium	1163 µg	50,0 µg	—

\*AJR = l'apport journalier recommandé

### Fabriqué par:

Dr. B. Scheffler Nachf.  
GmbH & Co. KG  
51469 Bergisch Gladbach  
Made in Germany

### Importé par:

Les Laboratoires  
AFRIC-PHAR  
Casablanca, Maroc

### Conseil d'utilisation:

Prendre un comprimé par jour dans un verre d'eau, donne une boisson savoureuse et rafraîchissante.

Additiva Comprimés effervescents Multivitamines + Minéraux + Oligo-éléments existe en plusieurs goûts: orange, mandarine, pêche et mangue.

L'AJR indiqué ne devrait pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Stocker hors de portée des enfants.

Dr. Scheffler®

PPV: 79DH70

PER: 10/23

LOT: J3041



## COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

## CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

## MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

## EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

## POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

## MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

## TABLEAU A (LISTE I).



bottu S.A

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

PPV: 79DH70

PER: 11/23

LOT: J3102



## COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

## CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

## MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

## EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques : prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

## POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

## MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

## TABLEAU A (LISTE I).



bottu SA  
82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

PPV:14DH00

PER:10/23

LOT:J2681

PARACÉTAMOL

**DOLIPRANE® 1000 mg**  
**Comprimé**

### **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :**

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs prégélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

### **QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

**Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :**

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?**

Contre-indications :

**Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :**  
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

### **PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :**

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

**Mises en garde :**

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").**

**Grossesse et allaitement :**

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



PPV 40DH90 EXP 10/2023  
LOT 0N039 1

20 comprimés effervescents.

**COMPOSITION QUALITATIVE :**

Sulfate de zinc monohydrate 123,5 mg  
(correspondant à 45 mg de zinc métal)

Excipient : acide citrique, bicarbonate de sodium, sorbitol, benzoate de sodium, polyoxyéthylène glycol 4000, saccharine sodique, cyclamate de sodium, saccharose, arôme citron-menthe, arôme caramel, qs 1 comprimé effervescent.

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :**

Oligo-élément.

**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

- Acné
- Séborrhée - Pelade - Chute de cheveux
- Psoriasis
- Aphose - Grande aphose buccale
- Eczéma atopique
- Ulcères des jambes
- Acrodermatite entéropathique.

**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :**

Risque de chélation dans le tube digestif avec :

- Tetracyclines
- Médicaments à base de calcium ou de fer
- Pansements gastriques alcalins
- Aliments à forte teneur en acide phytique (pain complet, germes de soja, grains de maïs).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

**EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :**

Saccharose, sorbitol, sodium cyclamate, saccharine sodique.

Teneur en sodium : environ 185 mg de sodium par comprimé effervescent.

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?****a - Posologie :**

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE



مَرْكَزُ الْأَكْهَوَى وَيْنَ Clinique Al Akhawayn

le 20/11/2020

~~6605~~ BERAD Mustapha

24.70 - TAREXET 50mg.



1cp le soir

ALAHYANE ABDELWAHAB  
Clinique Al Akhawayn  
Centre des dunes Essaouira  
Essaouira - Tel: 05 24 47 31 44

# TARAXET® 25 mg

30 Comprimés pelliculés sécables

AMM N° 347/15 DMP/21/NNP

PPV : 24,70 DH



6 118000 022954

## g, Film-coated ts yazine

Before you start taking this medicine.

Read it again.

If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet please tell your doctor or pharmacist.

### What is in this leaflet:

1. What TARAXET is and what it is taken for?
2. What you need to know before you take TARAXET?
3. How to take TARAXET?
4. Possible side effects
5. How to store TARAXET?
6. Further information.

### 1. WHAT TARAXET IS AND WHAT IT IS TAKEN FOR

TARAXET belongs to a group of medicines called antihistamines (used to treat allergic reactions). It is used:

- in adults and children to reduce itching caused by urticaria (nettle rash) and dermatitis (eczema),
- in premedication before general anaesthesia,
- to treat anxiety in adults.

### 2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE TARAXET

TARAXET contains lactose. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product. If you have hereditary galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption you should not take this medicine.

#### Do not take TARAXET:

- if you are allergic (hypersensitive) to hydroxyzine, cetirizine, other piperazine derivatives, aminophylline or ethylenediamine, or any of the ingredients of TARAXET (see Further information).
- if your ECG (electrocardiogram) shows a heart rhythm problem called "QT interval prolongation".
- if you have or had a cardiovascular disease or if your heart rate is very low.
- if you have low salt levels in your body (e.g. low level of potassium or of magnesium).
- if you are taking certain medicines for heart rhythm problems or medicines that may affect the heart rhythm (see Other medicines and TARAXET).
- if anyone in your close family has died suddenly of heart problems.
- if you are an asthmatic who has suffered a bad reaction to an antihistamine in the past.
- if you have porphyria (a disease which causes stomach pain, constipation, changes in the colour of urine, skin rashes and disturbed behaviour).
- if you are pregnant, trying to become pregnant or breast-feeding.
- if you have glaucoma (increased pressure in the eye).
- if you have difficulty passing water e.g. due to a prostate condition.

IF ANY OF THE ABOVE APPLIES TO YOU, OR IF YOU ARE NOT SURE, SPEAK TO YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE YOU TAKE TARAXET.

#### Warnings and precautions

Contact your doctor or pharmacist before you take TARAXET.

TARAXET may be associated with an increased risk of heart rhythm disorder which may be life threatening. Therefore, tell your doctor if you have any heart problems or are taking any other medicines, including medicines obtained without prescription.

While taking TARAXET, seek immediate medical attention if you experience heart problems such as palpitations, trouble breathing, loss of consciousness. Treatment with hydroxyzine should be stopped.

Before you take TARAXET tell your doctor if you suffer from:

- kidney disease or are on dialysis,
- liver disease. TARAXET is not suitable for patients with severe liver disease or

liver failure,

- digestive system or stomach problems,
- myasthenia gravis (a muscle weakness disorder),
- dementia,
- seizure disorders including epilepsy (fits),
- breathing problems,
- bladder outflow obstruction,
- hyperthyroidism (often referred to as an "overactive thyroid"),
- high blood pressure (hypertension).

Your doctor may adjust your dose if you are elderly.

TARAXET may affect the results of some tests for allergy or asthma. Treatment should be stopped 5 days (7 days for elderly) before skin testing for allergy is undertaken or prior to a methocholine test.

Always tell your doctor or nurse that you have been given TARAXET recently. IF THE ABOVE APPLIES TO YOU, OR IF YOU ARE NOT SURE, SPEAK TO YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE YOU TAKE TARAXET.

#### Other medicines and TARAXET

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. This includes medicines obtained without prescription. TARAXET can affect or be affected by other medicinal products.

Do not take TARAXET if you are taking medicine to treat:

- bacterial infections (e.g. the antibiotics erythromycin, moxifloxacin, levofloxacin),
- fungal infections (e.g. pentamidine),
- heart problems or high blood pressure (e.g. amiodarone, quinidine, disopyramide, sotalol),
- psychoses (e.g. haloperidol),
- depression (e.g. citalopram, escitalopram),
- gastro-intestinal disorders (e.g. prucalopride),
- allergy,
- malaria (e.g. mefloquine),
- cancer (e.g. toremifene, vandetanib),
- drug abuse or severe pain (methadone).

It is also important that you tell your doctor if you are taking any of the following medicines:

- adrenaline or epinephrine,
- barbiturates (for sleeping disorders and epilepsy),
- cimetidine (for ulcers and heartburn),
- antiemetics (drugs effective against vomiting and nausea),
- beta-blockers (used to treat a condition called Menière's disease),
- anaesthetics,
- muscle relaxants,
- opioids (medicines for relieving severe pain) anticholinergic medicines, these include some medicines used for irritable bowel syndrome, asthma or incontinence,
- aminophylline (for breathing problems),
- benzylpenicillin salts and chloramphenicol sodium succinate (antibiotics),
- doxorubicin hydrochloride (a chemotherapy drug),
- antidepressants, including monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (such as isocarboxazid or moclobemide), and tricyclics (such as amitriptyline) medicines to treat anxiety,
- medicines that help you sleep,
- benzodiazepines,
- anticholinesterase medicines (such as edrophonium and neostigmine),
- antimuscarinic medicines (such as atropine),
- antiepileptic medicines,
- other antihistamines,
- drugs which have effect on the brain will interact with antihistamines.

Hydroxyzine is an inhibitor of CYP2D6 (an enzyme that metabolizes some drugs) and may cause interactions with CYP2D6 substrates. Cetirizine does not interact with other drug substances via cytochrome P450 (a group of proteins involved in the metabolism).

#### Taking with food and drink

You should not take alcohol with TARAXET because the sedative effects of the alcohol may be increased.

#### Pregnancy and breast-feeding

Do not take TARAXET if you are pregnant, trying to become pregnant or breast-feeding. If you become pregnant whilst taking TARAXET tell your doctor immediately.