

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 068248

Optique **5536** Autres

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **3146** Société :

Actif Pensionné(e) Autre : **BETTAITE MOUAWAD**

Nom & Prénom : **NAJASSE**

Date de naissance : **09/02/1950**

Adresse : **IDFD**

Tél. : **06 20246154** Total des frais engagés : **812,55 Dhs** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Iman HASSAR
Dermatologue - Vénérologue
868, Boulevard Mohamed VI
Tél: 05 22 82 99 60 - CASABLANCA

Date de consultation : **28/12/2020**

Nom et prénom du malade : **DR BENYSS** Age : **19 ans**

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **Dem**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : **ACCOLLAGE**

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/12/2020	C2	C2	200.000	DR. Iman HASSAR Dermatologue - Vénérologue 868, Boulevard Mohammed VI Tél: 05 22 82 99 60 - CASABLANCA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	11433553
G	35533411	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur HASSAR Iman

Dermatologue - Vénéréologue
 Ancienne Interne du CHU Ibn ROCHD
 Spécialiste des maladies de la peau,
 de l'ongle et du cuir chevelu
 Maladies sexuellement transmissibles
 Cosmétologie, Allergologie, Laser,
 Chirurgie de la peau

الدكتورة حصار إيمان

اختصاصية في أمراض الجلد
 الأظافر والشعر، الأمراض التنايسية
 طب التجميل، الحساسية
 جراحة الجلد

PHARMACIE DE LA MUSIQUE
 Dr NABIL
 Docteur en Pharmacie
 6, Rue de l'Atlas - Maârif Casablanca
 Tel: 05 77 98 42 73

Casablanca, le : 28/12/2020 الدار البيضاء، في :

Monogramme

1 - Differin gel:
 66,00 درهم سعر
 سعر
 bush et j'enf.

2 - Acyclovir 8%
 130 درهم سعر
 سعر
 قابل للنفخ

3 - Bétona op.
 85 درهم سعر
 سعر
 قابل للنفخ

4 - Dexaméthasone minidose
 85 درهم سعر
 سعر
 قابل للنفخ

شارع محمد السادس (طريق مدينة سابقا) إقامة النصر GH2 الشقة 14 - الدار البيضاء

868, Bd Mohamed VI (Ex route Mediouna) Résidence ANNASR

GH2 - Appt 14 - Casablanca Tél.: 05 22 82 99 60

100 ml. Made in France

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



3 337872 413018

3612620908238

LOT

CICAPLAST /

Jr. San Martín 6060 / L'Oréal Color Riche S.R.L.
D.R.: atc@loreal.com.co / L'Oréal Perú, S.A.
RUC20416414018. Teléfono consumidor 0800 51-51

3612621881332

ANTI AGE 405

EXP LOT

sans parfum
ohne Duftstoffe

DIFFERINE 0,1%

Gel, tube de 30 g

AMM N°300 DMP/21/NCV

PV: 66,00 DH

Distribué par SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura-Maroc



6 118001 070213

n e



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel
Adapalène**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ?
3. COMMENT UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIACNEIQUE LOCAL.

(D. Dermatologie)

Acné de sévérité moyenne, particulièrement indiqué dans l'acné rétentionnelle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel ?

NOTICEot:
xp:

PPV: 85DH30

T9B376F
11 2022**RG GEDEON RICHTER****avant de prendre ce médicament.**

.

, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
ne ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?

1. QU'EST-CE QUE BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : progestatifs et estrogènes, associations fixes

BELARA est un CONTRACEPTIF HORMONAL ORAL. Lorsque les contraceptifs oraux contiennent 2 hormones comme dans BELARA, ils sont appelés "Contraceptif Oral Combiné" (COC). Les 21 comprimés de la plaquette contiennent les mêmes quantités d'hormones, c'est pourquoi BELARA est une contraception monophasique.

Les contraceptifs oraux comme BELARA ne vous protègent pas du Sida ou des autres affections sexuellement transmissibles. Seuls les préservatifs vous en protègent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?

Avant de commencer la prise de BELARA, votre médecin vous fera un examen général et gynécologique approfondi, éliminera la présence d'une grossesse, tiendra compte des contre-indications et précautions d'emploi, et décidera si BELARA vous convient. Cet examen devrait être effectué chaque année tout au long de la prise de BELARA.

2.1 Ne prenez jamais BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'éthinodiol, l'acétate de chlormadinone ou à l'un des excipients de BELARA ;
- Si vous souffrez, ou avez des antécédents de maladies des vaisseaux sanguins veineux et artériels, comme par exemple, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ;
- Si vous notez les premiers signes d'apparition de caillots sanguins, d'inflammation des veines, ou d'embolie, tels que une douleur dans la poitrine ou une sensation d'oppression dans la poitrine ;
- Si vous devez subir de longues périodes d'immobilisation (comme par exemple, alitement complet ou plâtre) ou lors d'opérations chirurgicales planifiées (arrêter BELARA 4 semaines avant la date prévue de l'opération) ;
- Si vous avez un diabète ou une glycémie mal contrôlée ;
- Si vous avez une hypertension artérielle non contrôlée (valeur constamment supérieure à 140/90 mm Hg) ;
- Si vous avez des troubles de la coagulation (par exemple, un déficit en protéine C) ;
- Si vous souffrez d'une atteinte du foie (par exemple, d'origine virale) ou une jaunisse ou tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas normalisées ;
- Si vous ressentez des démarcations sur tout le corps ou avez une maladie des voies biliaires, particulièrement en cas de survenue d'une précédente grossesse ou d'un traitement par estrogènes ;
- En cas d'augmentation du taux sanguin de bilirubine (produit de dégradation des globules rouges) par exemple due à une maladie de naissance (syndrome Dubin-Johnson ou maladie deRotor) ;
- Si vous avez une tumeur du foie (ou antécédent) ;
- si vous souffrez de maux d'estomac aigus, si vous présentez un grossissement du foie ou des signes d'hémorragie abdominale ;
- Si une porphyrine (affection des pigments sanguins) apparaît pour la première fois ou réapparaît ;
- Si vous avez ou avez eu ou si vous suspectez une tumeur maligne hormono-dépendante (par exemple, cancer du sein, des trompes) ;
- Si vous avez des troubles graves du métabolisme lipidique ;
- Si vous souffrez ou avez souffert d'une maladie inflammatoire du pancréas, accompagnée d'une augmentation importante des triglycérides ;
- Si vous souffrez de migraine apparaissant pour la première fois ;
- Si vous souffrez de céphalées anormalement sévères, fréquentes ou prolongées ;
- Si vous souffrez de migraine accompagnée de troubles de la vision, de la nausée, de la vomissio

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

Le risque des complications thrombo-emboliques augmente avec les facteurs suivants :

- âge ;
- tabac ;
- antécédents familiaux (maladies thrombo-emboliques dans la fratrie ou chez un parent relativement jeune). Si cela vous concerne, votre médecin pourra vous adresser à un spécialiste (pour vérifier la coagulation sanguine) avant de démarrer BELARA ;
- obésité (indice de masse corporelle > 30 kg/m²) ;
- troubles des différents paramètres biologiques lipidiques et protéiques (dyslipoprotéinémie) ;
- hypertension artérielle ;
- troubles cardiaques (maladies des valves cardiaques, fibrillation) ;
- en cas d'immobilisation prolongée, d'intervention chirurgicale importante, d'opération sur les jambes ou de sévères blessures. Dans ce cas, avertir votre médecin qui pourra vous conseiller d'interrompre le contraceptif au moins 4 semaines avant l'intervention et quand le reprendre (en général, 2 semaines au plus tôt après votre rétablissement) ;
- Autres maladies modifiant la circulation sanguine comme un diabète, un lupus érythémateux disséminé (une maladie du système immunitaire), un syndrome hémolytico-urémique (une maladie du sang qui atteint les reins), une maladie de Crohn ou colite ulcéraive (une inflammation chronique des intestins), une drépanocytose. Un traitement adapté à ces maladies permet de réduire le risque de complications.

• Cancer

Certaines études suggèrent qu'il existe un facteur de risque de cancer du col de l'utérus chez les utilisatrices de contraceptifs oraux (COC) à long terme qui ont présenté une infection du col de l'utérus par un virus sexuellement transmissible (papillomavirus). Cependant, d'autres facteurs pourraient intervenir (par exemple, le nombre de partenaires, une contraception mécanique). Des études ont rapporté une légère augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes sous COC. Cette majoration du risque disparaît progressivement au cours des 10 ans qui suivent l'arrêt des COC pour revenir au risque lié à l'âge. Le cancer du sein étant rare chez la femme de moins de 40 ans, le nombre plus élevé de cancers du sein diagnostiqués chez les utilisatrices habituelles ou nouvelles utilisatrices de COC est faible par rapport au risque global de cancer du sein.

Dans de rares cas, des tumeurs bénignes du foie, et dans de plus rares cas encore, des tumeurs malignes du foie ont été rapportées. Dans de rares cas isolés, ces tumeurs ont conduit à une hémorragie intra-abdominale mettant en jeu le pronostic vital. En cas de douleurs abdominales sévères qui ne disparaissent pas spontanément, consultez votre médecin.

• Autres maladies

Un certain nombre de femmes présente une légère augmentation de la pression artérielle sous contraception orale. Si votre pression artérielle augmente de façon importante sous BELARA, votre médecin vous proposera d'arrêter BELARA et vous prescrira un traitement pour abaisser la pression artérielle. Dès que votre pression artérielle reviendra à la normale, vous pourrez reprendre BELARA.

Si vous avez souffert d'herpès apparu lors d'une grossesse antérieure, celui-ci peut réapparaître lors de la prise d'un contraceptif oral.

Si vous avez des troubles lipidiques ou des antécédents familiaux de ces troubles (de type hypertriglycéridémie), vous avez un risque accru d'inflammation du pancréas. Si vous avez des troubles de la fonction hépatique, votre médecin vous conseillera d'arrêter BELARA jusqu'à ce que les paramètres hépatiques redéfinissent normaux. Si vous avez souffert de jaunisse lors d'une grossesse antérieure ou d'une prise antérieure de contraceptif oral et que celle-ci réapparaît, le médecin vous conseillera d'arrêter BELARA.

Votre médecin vous suivra régulièrement et pourra vous donner des conseils pour éviter les effets indésirables. Il pourra également vous conseiller de faire des examens de dépistage réguliers.

NOTICEot:
xp:

PPV: 85DH30

T9B376F
11 2022**RG GEDEON RICHTER****avant de prendre ce médicament.**

.

, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
ne ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?

1. QU'EST-CE QUE BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : progestatifs et estrogènes, associations fixes

BELARA est un CONTRACEPTIF HORMONAL ORAL. Lorsque les contraceptifs oraux contiennent 2 hormones comme dans BELARA, ils sont appelés "Contraceptif Oral Combiné" (COC). Les 21 comprimés de la plaquette contiennent les mêmes quantités d'hormones, c'est pourquoi BELARA est une contraception monophasique.

Les contraceptifs oraux comme BELARA ne vous protègent pas du Sida ou des autres affections sexuellement transmissibles. Seuls les préservatifs vous en protègent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?

Avant de commencer la prise de BELARA, votre médecin vous fera un examen général et gynécologique approfondi, éliminera la présence d'une grossesse, tiendra compte des contre-indications et précautions d'emploi, et décidera si BELARA vous convient. Cet examen devrait être effectué chaque année tout au long de la prise de BELARA.

2.1 Ne prenez jamais BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'éthinodiestradiol, l'acétate de chlormadinone ou à l'un des excipients de BELARA ;
- Si vous souffrez, ou avez des antécédents de maladies des vaisseaux sanguins veineux et artériels, comme par exemple, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ;
- Si vous notez les premiers signes d'apparition de caillots sanguins, d'inflammation des veines, ou d'embolie, tels que une douleur dans la poitrine ou une sensation d'oppression dans la poitrine ;
- Si vous devez subir de longues périodes d'immobilisation (comme par exemple, alitement complet ou plâtre) ou lors d'opérations chirurgicales planifiées (arrêter BELARA 4 semaines avant la date prévue de l'opération) ;
- Si vous avez un diabète ou une glycémie mal contrôlée ;
- Si vous avez une hypertension artérielle non contrôlée (valeur constamment supérieure à 140/90 mm Hg) ;
- Si vous avez des troubles de la coagulation (par exemple, un déficit en protéine C) ;
- Si vous souffrez d'une atteinte du foie (par exemple, d'origine virale) ou une jaunisse ou tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas normalisées ;
- Si vous ressentez des démarcations sur tout le corps ou avez une maladie des voies biliaires, particulièrement en cas de survenue d'une précédente grossesse ou d'un traitement par estrogènes ;
- En cas d'augmentation du taux sanguin de bilirubine (produit de dégradation des globules rouges) par exemple due à une maladie de naissance (syndrome Dubin-Johnson ou maladie deRotor) ;
- Si vous avez une tumeur du foie (ou antécédent) ;
- si vous souffrez de maux d'estomac aigus, si vous présentez un grossissement du foie ou des signes d'hémorragie abdominale ;
- Si une porphyrine (affection des pigments sanguins) apparaît pour la première fois ou réapparaît ;
- Si vous avez ou avez eu ou si vous suspectez une tumeur maligne hormono-dépendante (par exemple, cancer du sein, des trompes) ;
- Si vous avez des troubles graves du métabolisme lipidique ;
- Si vous souffrez ou avez souffert d'une maladie inflammatoire du pancréas, accompagnée d'une augmentation importante des triglycérides ;
- Si vous souffrez de migraine apparaissant pour la première fois ;
- Si vous souffrez de céphalées anormalement sévères, fréquentes ou prolongées ;
- Si vous souffrez de migraine accompagnée de troubles de la vision, de la nausée, de la vomissio

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BELARA 0,03 mg / 2 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

Le risque des complications thrombo-emboliques augmente avec les facteurs suivants :

- âge ;
- tabac ;
- antécédents familiaux (maladies thrombo-emboliques dans la fratrie ou chez un parent relativement jeune). Si cela vous concerne, votre médecin pourra vous adresser à un spécialiste (pour vérifier la coagulation sanguine) avant de démarrer BELARA ;
- obésité (indice de masse corporelle > 30 kg/m²) ;
- troubles des différents paramètres biologiques lipidiques et protéiques (dyslipoprotéinémie) ;
- hypertension artérielle ;
- troubles cardiaques (maladies des valves cardiaques, fibrillation) ;
- en cas d'immobilisation prolongée, d'intervention chirurgicale importante, d'opération sur les jambes ou de sévères blessures. Dans ce cas, avertir votre médecin qui pourra vous conseiller d'interrompre le contraceptif au moins 4 semaines avant l'intervention et quand le reprendre (en général, 2 semaines au plus tôt après votre rétablissement) ;
- Autres maladies modifiant la circulation sanguine comme un diabète, un lupus érythémateux disséminé (une maladie du système immunitaire), un syndrome hémolytico-urémique (une maladie du sang qui atteint les reins), une maladie de Crohn ou colite ulcéraive (une inflammation chronique des intestins), une drépanocytose. Un traitement adapté à ces maladies permet de réduire le risque de complications.

• Cancer

Certaines études suggèrent qu'il existe un facteur de risque de cancer du col de l'utérus chez les utilisatrices de contraceptifs oraux (COC) à long terme qui ont présenté une infection du col de l'utérus par un virus sexuellement transmissible (papillomavirus). Cependant, d'autres facteurs pourraient intervenir (par exemple, le nombre de partenaires, une contraception mécanique). Des études ont rapporté une légère augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes sous COC. Cette majoration du risque disparaît progressivement au cours des 10 ans qui suivent l'arrêt des COC pour revenir au risque lié à l'âge. Le cancer du sein étant rare chez la femme de moins de 40 ans, le nombre plus élevé de cancers du sein diagnostiqués chez les utilisatrices habituelles ou nouvelles utilisatrices de COC est faible par rapport au risque global de cancer du sein.

Dans de rares cas, des tumeurs bénignes du foie, et dans de plus rares cas encore, des tumeurs malignes du foie ont été rapportées. Dans de rares cas isolés, ces tumeurs ont conduit à une hémorragie intra-abdominale mettant en jeu le pronostic vital. En cas de douleurs abdominales sévères qui ne disparaissent pas spontanément, consultez votre médecin.

• Autres maladies

Un certain nombre de femmes présente une légère augmentation de la pression artérielle sous contraception orale. Si votre pression artérielle augmente de façon importante sous BELARA, votre médecin vous proposera d'arrêter BELARA et vous prescrira un traitement pour abaisser la pression artérielle. Dès que votre pression artérielle reviendra à la normale, vous pourrez reprendre BELARA.

Si vous avez souffert d'herpès apparu lors d'une grossesse antérieure, celui-ci peut réapparaître lors de la prise d'un contraceptif oral.

Si vous avez des troubles lipidiques ou des antécédents familiaux de ces troubles (de type hypertriglycéridémie), vous avez un risque accru d'inflammation du pancréas. Si vous avez des troubles de la fonction hépatique, votre médecin vous conseillera d'arrêter BELARA jusqu'à ce que les paramètres hépatiques redéfinissent normaux. Si vous avez souffert de jaunisse lors d'une grossesse antérieure ou d'une prise antérieure de contraceptif oral et que celle-ci réapparaît, le médecin vous conseillera d'arrêter BELARA.

Votre médecin vous suivra régulièrement pour vérifier si les effets indésirables peuvent survenir.