

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 053766

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1775 Société : 55262

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : MORCHID

Date de naissance :

Adresse :

Tél : 0669 984975 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Samia NEJJAR
Endocrinologue - Diabétologue
Complexe Al Massakha - 107, GHM
Appt. N°2, Sidi Mameur - Casablanca
Tél / Fax : 022 97 57 35

Date de consultation : 04/01/2021

Nom et prénom du malade : MORCHID ABBES Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : 2 Diabète de type 2 + Bronchite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CH SA Le : 04/01/2021

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant l'accomplissement des Actes
04/01/2021		C2	25066	Dr Samir NEJJAR Endocrinologue - Diabétologue 107, GHAZAL Casablanca 33 97 57 35

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Lot N° 1 Sidi Maarouf - Casablanca Boite 1029 0522 97 57 46 Fax : 0522 97 57 46	Date 07/1/2021	Montant de la Facture 866,20

[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Samia NEJJAR

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca
Ancienne interne des Hôpitaux de Paris
(Hôtel Dieu de Paris)

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie
Maladies Métaboliques et Nutrition

- Diabète • Goitre • Obésité • Hypertension artérielle
- Cholestérol • Stérilité • Trouble de croissance et de puberté • Pathologie surrénalienne & hypophysaire
- Pose de Pompe à Insuline •

الدكتورة سامية النجار

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

اختصاصية في أمراض الغدد، السكري، السمنة

- الغدة الدرقية • داء السكري • السمنة • الكوليسترول
 - الضغط الدموي • أمراض النمو والبلوغ • العقم
 - أمراض الكظران و الغدة النخامية
- تركيب مضخة الأنسولين

Casablanca, le 7/11/2021

MORCHID ABGES

1) D-CURE

36.00 x 12 1 an / 12 Mois

2) BENCLAMID 4 (11h30)

10640 x 2

3) ZIVLOX 400

3880

4) MUXOL 500

5) MEFSAL 15mg

14 au coucher

866.20

Docteur Samia NEJJAR
Endocrinologue - Diabétologue
Complexe Al Moustakbal, Imm. 107, GH 04
Appt. N°2, Sidi Maârouf - Casablanca
Tél / Fax : 022 97 57 35

PHARMACIE DE LA DECOUVERTE
Lot. Al Moustakbal - Casablanca
Route 1029, Sidi Maârouf - Casablanca
Tél. : 0522 97 3223 - Fax : 0522 97 57 46

PPV (DH) :

LOT N° :

UT. AV.:

38180

LOT : M0355
PER : 05/2022
PPU : 196,50DH

مشتريات ديفا للصيدلة
ج. واجدي صيدلي مسؤول

مشتريات ديفا للصيدلة
ج. واجدي صيدلي مسؤول

LOT : M0355
PER : 05/2022
PPU : 196,50DH

Jevea Pharmaceutique
118000 410041

Glibenclamide
Comprimés

0719001
PER05/24
REV36DH20

36,20

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.
- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémifiants.
- Diabète stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.
- Diabète instable grave.
- Diabète juvénile et insulino-dépendant.
- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).
- Insuffisance hépatique ou rénale grave.
- Allaitement.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonuryluree.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonuryluree.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

BENCLAMIDE

Glibenclamide
Comprimés

Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

36,20

0719001

PER05/24

FEV36DH20



BENCLAMIDE

Glibenclamide
Comprimés

Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiants.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

36,20

0719001

PER05/24

REV36DH20



Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonuryluree.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

BENCLAMIDE

Glibenclamide
Comprimés

Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

36,20

0719001

PER05/24

FEV36DH20



Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonurylurée.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonuryluree.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.

Glibenclamide
Comprimés



36,20
0719001
PER05/24
FV36DH20



Composition :

Glibenclamide

Excipients (dont lactose) q.s.p

Propriétés :

Sulfamide hypoglycémiant dérivé de la sulfonuryluree.

Indications thérapeutiques :

- Diabète mellitus non compensé diététiquement qui apparaît lors

stable, bénigne et sans graves troubles métaboliques.

- Diabète non compensé avec d'autres hypoglycémiantes.

- Diabète instable non grave, pour réduire la dose d'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité aux sulfamides ou à l'un des constituants.

- Diabète instable grave.

- Diabète juvénile et insulino-dépendant.

- Diabète avec décompensations métaboliques acidotiques graves (pré-coma et coma diabétique).

- Insuffisance hépatique ou rénale grave.

- Allaitement.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie

congénitale, de syndrome des malabsorption du galactose.

Effets indésirables :

Des signes d'intolérance gastrique ou des manifestations cutanées peuvent apparaître. Dans certaines occasions, des réactions hypoglycémiques peuvent se présenter (maaises, suffocation...). Dans tous les cas, consulter le médecin traitant.



مختبر التحليلات الطبية جينلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génélab
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOUZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017, CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

Mr MORCHID Abbes

Dossier N° : 291220-018

Page : 2/2

ANALYSES HORMONALES

TSH-us : Thyroestimuline-Hormone : 1,10 μ UI/ml (0,3 - 5,6) Antériorité
(Tech. Chimieluminescence/Access)

Valeurs Usuelles TSHus en μ UI/ml

- Pour les enfants de moins de 18 ans : les valeurs sont en fonction de l'âge
- Population globales âgées de 18 à 88ans
Homme : 0,30-5,6 μ UI/ml
Femme Non Enceinte : 0,25-5,6 μ UI/ml
- Femme enceinte :
1er Trimestre : 0,05-3,70 μ UI/ml
2ème Trimestre : 0,31-4,35 μ UI/ml
3ème Trimestre : 0,41-5,18 μ UI/ml

FT4 : THYROXINE LIBRE : 0,91 ng/dl (0,61 - 1,12)
(Tech. Chimieluminescence/Access)

Variation de la **TSHus** (μ UI/ml) & **T4L**(ng/dl) en fonction de l'âge :

Nourrisson à terme	: 1.3-19	: 0.8-1.9
3 jours	: 1.1-17	: 1.8-4.1
10 semaines	: 0.6-10	: 0.8-1.7
14 mois	: 0.4-7.0	: 0.6-1.7
5 ans	: 0.4-6.0	: 0.6-1.7
14 ans	: 0.3-5.0	: 0.6-1.4


Femme enceinte

1er trimestre	: 0.52 - 1.10
2eme trimestre	: 0.45 - 0.99
3eme trimestre	: 0.48 - 0.95

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon rétablissement

Dr. Mohamed BENAZZOUZ

Dr. Meriem HAOUANE



BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - اللفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدار البيضاء

Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm."C" - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 - ت.م - Patente : 35051078 - البتاتا - Fax : 05 22 93 10 61 - الفاكس

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - الهاتف - Gsm Whatsapp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com



مختبر التحليلات الطبية جينلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génelab
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOUZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017.CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

Compte rendu d'analyses

Demandé par Dr : NEJJAR SAMIA

Rés Al Moustakbal, Imm 107 GH04 Appt 2 Sidi Maârouf Casablanca

Tél : 0522975735 Fax : 0522975644

Casablanca

Edité le : 29/12/2020

Mr MORCHID Abbas

Date naissance: 01/07/1946

Code Patient : 20-07377

MUPRAS PY100%

INPEGENELAB : 093001394

INPE Bio : 097163968

IF : 51485800

Réf : 291220-018



Dossier créé le : 29/12/2020

Heure création: 8:31

Patient prélevé le : 29/12/2020

Heure Plvt : 8:48 ± 15 min

Page : 1/2

BILAN INFLAMMATOIRE ET/OU RHUMATOLOGIQUE

		Valeurs Usuelles	Antériorité
CRP: PROTEINE-C REACTIVE	: 1,01 mg/l	(Inférieur à 8)	
(Immuno Turbidimétrique/Beckman Coulter AU 480)			

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

		Valeurs Usuelles	Antériorité
GLYCEMIE à jeun	: 1,38 g/l	(0,7 - 1,1)	
(Enzymatique UV/Beckman Coulter AU480)			
	: 7,66 mmol/l	(3,89 - 6,11)	
HEMOGLOBINE GLYQUÉE	: 6,50 %	(4 - 6)	
(Technique : HPLC /D10 DE BIORAD)			
➤ Pour un Diabète de type 2 :			
→ traité par antidiabétiques oraux ,			
le taux d'HgA1c doit être < à 6,5% (ou 7% selon le type de traitement)			
→ traité par insuline ,			
le taux d'HgA1c doit être < à 7%.			
→ du sujet très âgé ,			
le taux d'HgA1c doit être < à 8%			
➤ Pour un Diabète de type 1 ,			
le taux d'HgA1c doit être compris entre 7 et 7,5%.			
Attention, ces chiffres varient en fonction du type de diabète, du traitement, de l'âge et des complications			
ACIDE URIQUE	: 44,71 mg/l	(35 - 72)	
(M.Enzymatique Uricase Peroxy/Beckman Coulter AU 480)			
	: 266,02 µmol/l	(208,3 - 428,3)	
CHOLESTEROL TOTAL	: 1,72 g/l	(Inférieur à 2)	
(M.Enzymatique colorimétrique/Beckman Coulter AU480)			
	: 4,44 mmol/l	(3,63 - 5,18)	
TRIGLYCERIDES	: 0,73 g/l	(Inférieur à 1,5)	
(M.Enzymatiques/Beckman Coulter AU480)			
	: 0,83 mmol/l	(Inférieur à 1,71)	

NB : Le prélèvement a été réalisé après s'être assuré des bonnes conditions de prélèvement.

Cependant, nous tenons à rappeler que le non-respect strict du délai de jeûne, peut (chez certaines personnes prédisposées) donner des valeurs élevées, significatives en comparaison avec l'historique du patient de :

- Triglycerides (++)
- Cholesterol total (+/-).

A savoir :

- * Régime normo-lipidique durant les 3 jours qui précèdent le prélèvement
- * Un jeûne d'au moins 12 h

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - الالفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدار البيضاء

Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm. "C" - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 : ت.م - Patente : 35051078 - البنانا : 05 22 93 10 61 - الفاكس :

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - الهاتف - Gsm Whatsapp : 0676 84 52 02 - Site web

