

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 528

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENOUHOU D MOHAMMED

Date de naissance : 29/01/42

Adresse : 3, Rue Sânia Benouhoud, Cas. B, 8<sup>e</sup> étage

Appart<sup>5</sup> 5<sup>e</sup> étage, Palme Casablanca

Tél. : 05 22 20 45 45

Total des frais engagés : 1652 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 29/10/2021

Nom et prénom du malade : BBN OUMAR Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 14/10/2021

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/21	3		3000 HT	ABDOU MAMADOU CASSEBIAUCHE 19/01/2021

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
CHRABI KHALIL Décret en Pharmacie Anglaises Rodi et Compagnie Quai de Palmeier - Casablanca 161 0522 25 1467	18.08.10/60	192.00

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<b>BIO MEDICA</b> 160 Rue M. Maâtki r. Mourad CHIKILI Casablanca Tunisie 10000 - Casablanca Tunisie 10000 - Casablanca Tunisie 10000 - Casablanca Tunisie 10000 - Casablanca	12.01.2021	B210 + Z44 + 30	460,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

\*Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>		<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>		
		$  \begin{array}{r l}  H & 25533412 \quad 21433552 \\  \hline  D & 00000000 \quad 00000000 \\  & 00000000 \quad 00000000 \\  & 35533411 \quad 11433553 \\  \hline  B &   \end{array}  $		
		<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		
<img alt="Diagram of the dental arches with numbered teeth (1-8) and letters D, G, H, B indicating anatomical				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien  
Chirurgie de la colonne vertébrale  
Electroencéphalographie

18, Rue Abou Maachar quartier des Hôpitaux  
(à coté de Radiologie Anoual) - Casablanca  
Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00  
E.mail: doctoralaoui@hotmail.com

Sur Rendez-vous



# الدكتور عزيز علوى المصطفى

أخصائى فى أمراض وجراحة الرأس  
الدماغ، الأعصاب والعمود الفقري  
التخطيط الكهربائي للدماغ  
18، زقة أبو معشر حى المستشفيات  
بجانب الفحص بالأشعة أنوال - الدار البيضاء  
الهاتف: 05 22 86 41 00  
doctoralaoui@hotmail.com  
البريد الإلكتروني: doctoralaoui@hotmail.com  
بالوعد

Casablanca, le..... الدار البيضاء في

09/01/2021

## BENOUHOUD MOHAMED

TREMADOL 100 MG CP

1 COMP 10H 22H

CELEBREX 200

1 COMP 13H

18, Rue Abou Maachar - Anoual  
Dr. A. ALAOUI Neurochirurgien - Anoual  
Dr. A. ALAOUI Neurochirurgien - Anoual

103,00

89,100

00,12,00

Pharmacie du CEDRE  
Dokter Ruedi en Phezmacie  
Quarter Paimier - Casablanca  
Tél: 0523 25 14 67  
INP: 0920 177342  
Ingle Rues Ruedi en Phezmacie  
Dokter Ruedi en Phezmacie  
Quarter Paimier - Casablanca  
Tél: 0523 25 14 67  
INP: 0920 177342

En cas d'urgence contacter Clinique Anoual au Tél.: 05 22 86 02 07/08/09/10 - الهاتف: 05 22 86 02 07/08/09/10 - الهاتف:

Patente : 36300235 - I.F.:42023905 - N° CNSS: 2359330 - ICE: 002051462000048

# Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien

Chirurgie de la colonne vertébrale

Electroencéphalographie

18, Rue Abou Maachar quartier des Hôpitaux  
(à coté de Radiologie Anoual) - Casablanca

Casablanca - Tél.: **05 22 86 41 00**

E.mail: [doctoralaoui@hotmail.com](mailto:doctoralaoui@hotmail.com)

Sur Rendez-vous



# الدكتور عزيز علوى المصطفى

أخصائى فى أمراض وجراحة الرأس،

الدماغ، الأعصاب والعمود الفقري

التحفيط الكهربائي للدماغ

18، زنقة أبو معشر حى المستشفيات

جانب الفحص بالأشعة أنوال - الدار البيضاء.

الهاتف: **05 22 86 41 00**

البريد الإلكتروني: [doctoralaoui@hotmail.com](mailto:doctoralaoui@hotmail.com)

بالموعد


Casablanca, le..... الدار البيضاء في

09/01/2021

## BENOUHOUD MOHAMED

NFS VS CRP UREE AC URIQ

FA S 28



En cas d'urgence contacter Clinique Anoual au Tél.: 05 22 86 02 07/08/09/10 - الهاتف: للحالات المستعجلة اتصلوا بمصحة أنوال -

Patente : 36300235 - I.F.:42023905 - N° CNSS: 2359330 - ICE: 002051462000048

*Dr. Fathallah Harim*

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Casablanca, le 12.01.2021

FACTURE N°FAS23

Mme - Mr B. Nouhoud Mohamed

Veuillez trouver la note d'honoraires concernant

les analyses médicales faites au laboratoire et

demandées par le Dr Al Aoui A

Le montant s'élève à 460,00 Dh

Quatre Cent Sixante Dirhams

BIOMEDICA  
I.F : 852 123  
INPE : 097159255  
ICE : 001688679000032

**Dr. Fathallah Harim**

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : ALAOUI-A

Prél. le : 12/01/2021

Édité le : 12/01/2021

**Nom : Mr BENOUEHOUD MOHAMED**

**Réf : FAS28**

**DOMICILE**

**Resultats    Unités    Valeurs Normales**

**HEMATOLOGIE**

**NUMERATION FORMULE**

HEMATIES.....	5 021 000	/mm3	[ 4 000 000 -- 5 800 000 ]
HEMOGLOBINE.....	15.2	g/dl	[ 12.5 -- 17 ]
HEMATOCRITE.....	47.5	%	[ 40 -- 50 ]
- VGM.....	94.6	μ3	[ 80 -- 95 ]
- CGMH.....	32	%	[ 30 -- 35 ]
- TGMH.....	30.27	pg	[ 27 -- 33 ]
LEUCOCYTES.....	8 700	/mm3	[ 5 500 -- 8 500 ]
POLY. NEUTROPHILES.....	68.4	%	[ 50 -- 75 ]
POLY. EOSINOPHILES.....	1.8	%	[ 1 -- 3 ]
POLY. BASOPHILES.....	0.6	%	[ 0 -- 1 ]
LYMPHOCYTES.....	20.5	%	[ 25 -- 38 ]
MONOCYTES.....	8.7	%	[ 2 -- 9 ]
PLAQUETTES.....	336 000	/mm3	[ 200 000 -- 400 000 ]

Automate NIHON KOHDEN - CF.

**VITESSE DE SEDIMENTATION**

VS 1ERE HEURE.....

19

mm

[ 1 -- 10 ]

Technique de Westergreen.

**LABORATOIRE  
BIOMEDICA**  
160, Rue M. Maâni - Casablanca

*Dr. Fathallah Harim*

Pharmacien Biogiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : ALAOUI-A

Prél. le : 12/01/2021

Édité le : 12/01/2021

**Nom : Mr BENOUEHOUD MOHAMED**

Réf : FAS28

DOMICILE

Resultats   Unités   Valeurs Normales

**BIOCHIMIE**

**ACIDE URIQUE**

RESULTAT.....

**60.7**

mg/l

[ 34 -- 70 ]

OU.....

**360.56**

mmol/l

[ 202 -- 416 ]

Automate KONELAB 20i Thermor.

**UREE**

RESULTAT.....

**0.49**

g/l

[ 0.22 -- 0.41 ]

OU.....

**8.18**

mmol/l

[ 3.66 -- 7.01 ]

Automate KONELAB 20i Thermor.

LABORATOIRE  
BIOMEDICA  
160, Rue M. Maâni - Casablanca

TSV/P

→

# Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien

Chirurgie de la colonne vertébrale

Electroencéphalographie

18, Rue Abou Maachar quartier des Hôpitaux  
(à coté de Radiologie Anoual) - Casablanca

Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00

E.mail: [doctoralaoui@hotmail.com](mailto:doctoralaoui@hotmail.com)

Sur Rendez-vous



Casablanca, le.....

# الدكتور عزيز علوى المصطفى

أخصائى فى أمراض وجراحة الرأس،

الدماغ، الأعصاب والعمود الفقري

التحفيط الكهربائي للدماغ

• 18، زنقة أبو معشر حى المستشفيات

بجانب الفحص بالأشعة أنوال - الدار البيضاء.

الهاتف: 05 22 86 41 00

البريد الإلكتروني: [doctoralaoui@hotmail.com](mailto:doctoralaoui@hotmail.com)

بالموعد

الدار البيضاء في

09/01/2021

## BENOUHOUD MOHAMED

RX GENOU GH F ET P  
ECHO GENOUX GH

Dr. A. ALAOUI  
18, Rue Neurochir El Maani  
Rue Abou Maachar quartier des Hôpitaux  
Tél: Casablanca - 05 22 86 41 00

Dr. Mourad CHKILI  
RADIOLOGUE

160, Rue Mostapha El Maani 20130 - Casablanca  
Tél: 05 22 22 11 77 - 05 22 20 70 10  
Email: [m.chkili@gmail.com](mailto:m.chkili@gmail.com)

13 JAN. 2021

**RADIOLOGIE MOSTAFA EL MAANI  
DR. CHKILI MOURAD  
160, RUE MOSTAFA EL MAANI  
TEL / 022 22 11 77  
PATENTE N° 34103962  
CNSS / 1782178  
I.N.P 091042051  
ICE / 001660283000036**

**FACTURE N° 16 01 21**

Reçu de BENOUEHOUD MOHAMED  
La somme de SEPT CENTS dirhams (700.00 DH)  
Correspondant au montant de mes honoraires pour :  
-RADIOS : GENOU GAUCHE DE FACE + PROFIL. Z14  
+ ECHOGRAPHIE DU GENOU GAUCHE. K30

**P.S : Toute réclamation ultérieure, concernant le montant facturé ou la date de facturation sera rejetée, nous vous serons gré de bien vouloir vérifier ces deux données sur le présent reçu.**

*Dr. Mourad CHKILI  
RADIOLOGUE  
160, Rue Mostapha El Maani 20130 Casablanca  
tel: 05 22 22 11 77 / 05 22 20 10 00  
Email: m.chkili@gmail.com*

**Fait à Casablanca le : 13.01.2021**

**SIGNATURE**

# الفحص بالأشعة مصطفى المعانى

## RADIOLOGIE MOSTAPHA EL MAANI

0522 20 76 160، شارع مصطفى المعانى 130 الدار البيضاء - الهاتف : 0522 22 11 77 - الفاكس : 160, Rue Mostapha EL Maâni 20130 - Casablanca - Tél : 0522 22 11 77 - Fax : 0522 20 76 10

**Dr. CHKILI M.**

Radiologue

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris  
COCHIN PORT ROYAL  
Ancien Attaché Associé des Hôpitaux de Paris  
N° d'autorisation : 11793 du 23-04-93

**الدكتور الشكيلي مراد**

إختصاصي في الفحص بالأشعة

خريج كلية الطب بباريس

طبيب ملحق سابق بمستشفيات باريس

رخصة رقم : 11793 بتاريخ : 23-4-93

mercredi 13 janvier 2021.

**NOM ET PRENOM : BENOUEHOUD MOHAMED**

**RX : GENOU GAUCHE F/P EN CHARGE + ECHOGRAPHIE DU  
GENOU GAUCHE**

**POUR LE DR : AZIZ ALAOUI EL MOSTAPHA**

### **1/-RX. GENOU G :**

Bon alignement des segments du genou.

Discret pincement des interlignes fémoro tibiaux des deux côtés avec légère condensation des plateaux tibiaux et petite ébauche ostéophytique tibiale externe.

Il n'y a pas de calcification intra articulaire.

Très léger comblement du cul de sac sous quadripéctal compatible avec un discret épanchement articulaire.

### **2/- ECH GENOU G :**

Présence d'une petite lame liquide au niveau du cul de sac sous quadripéctal de 2 mm d'épaisseur.

Aspect normal du ligament du quadriceps et du ligament sous rotulien.

Présence d'un kyste du creux poplité latéralisé du côté interne, descendant dans le jumeau interne, mesurant 42 mm de plus grand axe et 7 mm d'épaisseur.

### **CONCLUSION :**

Discret épanchement dans le cul de sac sous quadripéctal avec kyste du creux poplité descendant dans le jumeau interne, mesurant 42 mm de plus grand axe et 7 mm d'épaisseur.

**Dr. Mourad CHKILI**  
**RADIOLOGUE**  
160, Rue Mostapha El Maâni 20130 - Casablanca  
Tél: 05 22 22 11 77 - 05 22 20 76 10  
Email: m.chkili@gmail.com

**DR. M. CHKILI**

# Tramal® L.P. 150mg

Chlorhydrate de tramadol

Comprimé à libération prolongée

## MÉDICAMENTS POUVANT ÊTRE OBTENUS UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire à nouveau.

### DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée  
LISTE COMPLETE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXCIPIENTS

La substance active est: chlorhydrate de tramadol (150 mg)

Excipients : g.s.p. 1 comprimé.

I. QU'EST CE QUE TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU: CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

Comprimé à libération prolongée, de forme ronde et de couleur orange clair : boîte de 10 et 30.

Le tramadol principe actif contenu dans TRAMAL® L.P. 150 mg est un analgésique (substance calmant la douleur) qui appartient à la classe des opiacés. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau.

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TRAMAL® L.P. 150 mg. est utilisé pour le traitement des douleurs modérées à intenses

II. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée?

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

### CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez pas TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée:

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au tramadol ou à l'un des autres composants de TRAMAL® L.P. 150 mg

• En cas d'intoxication aiguë par l'alcool, des somnifères, d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions)

• Si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la MAO (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par TRAMAL® L.P. 150 mg (voir «Utilisation d'autres médicaments»)

• Si vous êtes épileptique et que vos crises ne sont pas bien contrôlées par le traitement;

• Comme traitement de substitution dans le cadre du sevrage d'une toxicomanie.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / MISES EN GARDE SPÉCIALES

Prendre des précautions particulières avec TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée

• Si vous estimez que vous êtes dépendant à d'autres antalgiques (opiacés)

• Si vous souffrez de troubles de la conscience (si vous avez l'impression que vous allez vous évanouir)

• Si vous êtes en état de choc (ce qui peut se manifester par des sueurs froides)

• Si vous souffrez d'une augmentation de la pression dans le cerveau (par exemple après un traumatisme crânien ou une maladie cérébrale)

• Si vous avez des difficultés respiratoires

• Si vous présentez une tendance à l'épilepsie ou aux convulsions

• Si vous souffrez d'une maladie hépatique ou rénale.

Dans ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Notez bien que TRAMAL® L.P. 150 mg peut provoquer une dépendance physique et psychique. Quand TRAMAL® L.P. 150 mg est pris pendant une durée prolongée, son effet peut s'atténuer, si bien qu'il faut augmenter les doses (développement d'un phénomène d'accoutumance). Les patients qui ont tendance à abuser des médicaments ou qui sont dépendants de certains médicaments ne doivent utiliser TRAMAL® L.P. 150 mg que pendant de courtes durées et sous surveillance médicale stricte.

Veuillez également informer votre médecin ou votre pharmacien pendant le traitement par TRAMAL® L.P. 150 mg.

### INTERACTIONS AVEC LES AUTRES MÉDICAMENTS

Prise de TRAMAL® L.P. 150 mg avec d'autres médicaments et boissons

Ne consommez pas d'alcool avec TRAMAL® L.P. 150 mg car cela accentuerait ses effets.

### UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Il n'existe que très peu d'informations sur l'utilisation de TRAMAL® L.P. 150 mg chez la femme enceinte.

D'une manière générale, l'emploi de TRAMAL® L.P. 150 mg chez la femme enceinte est déconseillé.

De faibles quantités de TRAMAL® L.P. 150 mg peuvent être absorbées par le lait maternel.

Après une prise unique de TRAMAL® L.P. 150 mg, l'effet peut durer jusqu'à 24 heures.

Il est recommandé de faire une pause de 24 heures entre la prise de TRAMAL® L.P. 150 mg et la maternité.

EFFETS SUR L'APTITUDE À UTILISER DES MACHINES

Conduite de véhicules et utilisation de machines

TRAMAL® L.P. 150 mg peut provoquer des vertiges et une vision floue.

Il est recommandé de faire une pause de 24 heures entre la prise de TRAMAL® L.P. 150 mg et la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

### LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Information importante concernant certains composants de TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée:

Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre ce médicament.

### INTERACTION AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Veuillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous recevez ou avez reçu récemment tout autre médicament, y compris des médicaments délivrés sans ordonnance. Il ne faut pas prendre TRAMAL® L.P. 150 mg avec des inhibiteurs de la MAO (médicaments destinés au traitement de la dépression).

L'effet analgésique de TRAMAL® L.P. 150 mg peut être atténué et sa durée d'action raccourcie si vous prenez des médicaments contenant:

• La carbamazépine (un antépileptique);

• La pentazocine, de la nalbuphine ou de la buprénorphine (des antalgiques);

• L'ondansetron (pour prévenir les nausées).

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre TRAMAL® L.P. 150 mg avec quelle posologie.

### Le risque d'effets indésirables augmente

• Si vous prenez en même temps que TRAMAL® L.P. 150 mg, des médicaments qui ont un effet dépresseur sur le système nerveux comme les tranquillisants, les somnifères, d'autres antalgiques tels que la morphine et la codéine (également si ces médicaments sont prescrits pour traiter la toux), ainsi que l'alcool, vous risquez de vous sentir plus somnolent ou d'avoir l'impression que vous allez vous évanouir. Si cela se produit, parlez-en à votre médecin.

• Si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer des convulsions (crises d'épilepsie), par exemple des médicaments destinés au traitement de maladies psychologiques (comme certains antépresseurs). Le risque de crise d'épilepsie peut augmenter si vous prenez TRAMAL® L.P. 150 mg en même temps. Votre médecin vous dira si TRAMAL® L.P. 150 mg vous convient.

• Si vous prenez des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (souvent appelés IRESS) ou des inhibiteurs de la MAO (pour le traitement de la dépression), TRAMAL® L.P. 150 mg peut interagir avec leur effet ce qui peut, rarement, conduire à un «syndrome sérotoninergique». Ce syndrome peut se manifester, par exemple, par une confusion, une agitation, de la fièvre, des sueurs, des mouvements non coordonnés des membres ou des yeux, des saccades musculaires incontrôlables ou une diarrhée.

• Si vous prenez des anticoagulants dérivés de la coumarine (médicaments fluidifiant le sang), par exemple de la warfarine, en même temps que TRAMAL® L.P. 150 mg, l'effet de ces médicaments sur la coagulation peut s'en trouver modifié et il peut survenir des hémorragies.

### III. COMMENT UTILISER TRAMAL® L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée ?

#### INSTRUCTIONS POUR UN BON USAGE

#### POSOLOGIE, FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION ET DURÉE DU TRAITEMENT MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Prenez toujours TRAMAL® L.P. 150 mg en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Il faut ajuster la posologie en fonction de l'intensité de votre douleur et de votre sensibilité personnelle à la douleur. D'une manière générale, il faut prendre la dose minimale qui soulage la douleur.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la posologie usuelle est la suivante:

ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 12 ANS :

PPV: 103DH00

PER: 05/25

LOT: J1487

# CELEBREX® gélule

## Celecoxib 100 ou 200 mg

### LISEZ ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CETTE NOTICE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT.

Elle contient des informations importantes sur le traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, par quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous de la relire.

#### CELEBREX 100 mg, gélule

La substance active est le célecoxib (100 mg).

Les autres composants sont : lactose monohydraté, laurylsulfate de sodium, povidone K30, croscarmellose magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encre contenant de l'indigo bleu (E132).

#### CELEBREX 200 mg, gélule

La substance active est le célecoxib (200 mg).

Les autres composants sont : lactose monohydraté, laurylsulfate de sodium, povidone K30, croscarmellose s magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), encre contenant de l'oxyde DANS QUEL CAS UTILISER CELEBREX ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 10 gélules ou 20 gélules.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Par son mécanisme d'action, il fait partie des sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2). Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), pour soulager les signes de l'arthrose et les signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, il est également indiqué dans le traitement des signes de la spondylarthrite ankylosante.

#### NE PAS PRENDRE CELEBREX DANS LES CAS SUIVANTS :

antécédent d'allergie à l'un des constituants de ce médicament ou aux sulfamides, ulcère gastro-duodénal en cours, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie grave du cœur, maladie grave du foie, maladie grave d'asthme ou d'allergie (rhinite, polypes dans le nez, brusque gonflement du visage et du cou, urticaire ou autres réactions déclenchées par la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les inhibiteurs de la COX-2, grossesse ou femme susceptible d'être enceinte, en l'absence d'une contraception efficace (cf. chapitre "Grossesse - Allaitement"), allaitement. Le Celebrex est contre-indiqué chez les patients présentant une maladie cardiaque (telle qu'une angine de poitrine, un infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque) ou une maladie cérébro-vasculaire (antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire).

#### PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC CELEBREX :

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Le Celebrex doit être utilisé avec prudence pour les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, tel qu'une hypertension, un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un tabagisme.

AVANT LE TRAITEMENT, PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN : en cas d'antécédents digestifs (oesophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou de l'intestin ancien ou hémorragie digestive), en cas de maladie du cœur, du foie ou du rein, d'hypertension artérielle, d'œdème, de traitement par diurétique, en cas de traitement anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant concomitant (ex : aspirine à dose élevée, warfarine, anticoagulants oraux), en cas d'infection, en cas d'intolérance au lactose [galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares)], en raison de la présence de lactose. En fonction de ces différents cas, votre médecin pourra être amené à vous suivre régulièrement et/ou à adapter, si nécessaire, la posologie de votre médicament. Il en est de même en fonction de votre âge.

AU COURS DU TRAITEMENT, ARRETER CELEBREX ET CONTACTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE en cas : d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration noire des selles), de symptômes pouvant évoquer une réaction allergique sévère telle que crise d'asthme, gêne respiratoire, brusque réaction du visage et du cou ou toute réaction cutanée, de maladie cardiaque dont les symptômes semblent s'aggraver (essoufflement, douleurs thoraciques ou augmentation des œdèmes). Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le célecoxib. Vous devez éviter de prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris les médicaments contenant du célecoxib) et/ou de l'aspirine (sauf à dose anti-agrégante plaquettaire). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.


#### GROSSESSE - ALLAITEMENT :

##### Grossesse

L'utilisation de ce médicament est CONTRE-INDIQUÉE pendant la grossesse et pour les femmes susceptibles d'être enceintes (absence de contraception efficace). Les effets de ce médicament, notamment à partir du 3ème trimestre de la grossesse, peuvent avoir des conséquences graves sur votre enfant, sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule prise. Si vous découvrez

QUADRICEPS

ROTULE



No.44/44

GB:23 70/-2/5/1/-  
L54M Gén. Musculoskeletal 40mm

HITACHI RAMEM /DR M.CHKILI  
IM:31 BENOUHOUD MOHAMED PM P:H MI  
13-JAN-21 08:58:24  
A ◀ ▶ -04

GENOU G

LIGR SOUS ROTULIEN


ROTULE

No.84/84

GENOU G

ROTULE

QUADRICEPS



No.84/84

GB:23 70/-2/5/1/-  
L54M Gén. Musculoskeletal 40mm

HITACHI RAMEM /DR M.CHKILI  
IM:12 BENOUHOUD MOHAMED PM P:H MI  
Curseur  
D1: 42.6 mm  
D2: 7.1 mm  
13-JAN-21 09:00:47  
A ◀ ▶ -04 +0.2

KYSTIE CREUX POPLITE G

D1  
-06.2 cm/s

No.84/84

GB:23 70/-2/5/1/-  
L54M Gén. Musculoskeletal 40mm